Rostocker Dokumentenserver
Dieses Werk wurde Ihnen durch die Universitätsbibliothek Rostock zum Download bereitgestellt.
Für Fragen und Hinweise wenden Sie sich bitte an: digibib.ub@uni-rostock.de

Johann Friedrich Prahl

Index Plantarum, quae circa Gustroviam sponte nascuntur, phanerogamarum

Güstrow: Gedruckt bei H.H.L. Ebert's Erben, 1837

http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058

Druck Freier Zugang PUBLIC DOMAIN



Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0001
Mecklenburg Vorpommern

KUNST-U. ALTERTHUMS-VEREIN
GÜSTROW
1890.

R 45
D 33

Bücherei des Heimatmuseums
Güstrow

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0003
Mecklenburg Vorpommern

13

Güstrowsche Schulschriften.

Viertes Stück.

Index Plantarum,

quae circa Gustroviam sponte nascuntur,

phanerogamarum.

Scripsit

J. F. Prahl,

Gymn. Gustrov. Praeceptor.

Womit

zu der am 2. October

anzustellenden

Prüfung der Jugend

alle

Gönner und Freunde unserer Schule

mit gebührender Achtung einladet

Dr. Joh. Friedr. Besser,

Professor und Rector der Domschule.

Güstrow, 1837.

Gedruckt bei H. H. L. Ebert's Erben.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0005
Mecklenburg Vorpommern

L. S.

Ne eos lectores, qui herbariam minus curant, in solenni hac scriptione scholastica, quoniam maximam partem in nominibus versetur, parum respexisse viderer, primum mihi in animo erat, antequam agri nostri plantas recenserem, prooemii loco breviter exponere, quam utile sit studium botanicum et qua ratione instituendum studiosae juventuti. Sed quum vix ipsi Indici locus sufficeret, ut, omissis ceteris, illum potissimum ederem, movit me et virorum mihi venerandorum auctoritas et fructus, quem inde ad discipulos nostros, praecipue eos, apud quos ipse elementa botanices tradendi munere fungor, redundaturum esse sperabam. Neque vero botanophilis aliis, quorum etiam in patria nostra in dies crescit numerus, plane inutile aliquid vel ingratum me fecisse mihi persuadeo. Desideratur enim adhuc Flora Megalopolitana, quae omnes, quas patriae solum alit, plantas enumeratas vel descriptas contineat; quae ut tandem feliciter absolvatur, non est unius virium neque laboris. Eorum, quae ipse conferre potui, perpauca quidem sunt nova, sed in his certe unius plantae varietas est, quae testibus viris cll. Reichenbachio et Kochio in Germania nondum lecta erat: Cerastium semidecandrum L. γ. *glaberrimum Koch.* Vid. Ind. nr. 356. Hanc ceterasque plantas, quas Dethardingii Conspectus non habet, asterisco (*) notavi. Sed quamquam per septem fere annos agrum nostrum perscrutatus sum, ne nunc quidem me omnes ejus divitias eruisse putaverim, quum usque ad hunc diem

*

nullus praeterierit annus, quin, etiam in locis saepius a me aditis, novas mihi plantas reperissem. Summa autem fide nullam indicavi plantam, quam ipse non legi vel certe vidi, exceptis paucis, quas amicus mihi olim conjunctissimus, Johnius, pharmaceuta rei herbariae peritissimus, quocum plurimas legi, a se inventas mihi indicavit. His ipsius nomen adscripsi. — Duces, quos sequerer in examinandis plantis, praeter Reichenbachium [Flora Germanica excursoria Lips. 1832. Mössler's Handb. 3te Aufl. von Reichenb. Altona 1834.] et Kochium Erlangensem [Synopsis Florae Germanicae et Helveticae Sect. I. Francof. ad M. 1836.], viros in numero botanicorum clarissimos, vix alium habui. Posteaquam confectus jam erat Index meus, nactus sum cl. Meyeri Chlorim Hanoveranam [Götting. 1836.], qua si prius uti mihi licuisset, plura forsitan mutassem. Nunc pauca tantum ad doctissimi viri judicium censuramque correxi, in quo tamen dubitationis aliquid mihi remansisse fateor de Rubo corylifolio *Smith.* Sed hoc non mirabuntur harum rerum periti mihique condonabunt, si forte in hoc et in ceteris aeque intricatis generibus erraverim. — Si quam plantam raram esse adnotavi, hoc de nostro tantum agro intelligendum esse, periti facile ipsi videbunt, quamquam etiam sunt inter eas, quae quovis loco raro inveniuntur. — Ordinem in enumerandis plantis retinui eum, qui est in Dethardingii Conspectu, ut, quid plantarum in isto libello recensitarum circa nostram urbem reperiatur, facilius perspici possit. Ne multis morer, hoc unum adjiciam: tironum gratia me nomina auctorum integra adscripsisse praeter Linnaei celebratissimum, locorum autem ea tantum addidisse, quae vel sola plantam alunt, vel ceteris copiosius, nonnunquam etiam, quae urbi sunt proxima.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0008
Mecklenburg Vorpommern

Classis I. Monandria.

1. Hippuris [*Tannenwedel*].

1. H. vulgaris *L.* (im Gutower u. Sumpfsee; Jul. Aug.)

Classis II. Diandria.

2. Lemna [*Wasserlinse, Entenflott*].

2. L. trisulca *L.* (in fossis et aquis stagnantibus: im Stadtgraben etc. Jun. — Aug.) Neque hanc neque ceteras Lemnas in nostra regione florentes vidi.
3. L. minor *L.* (ibidem eodem tempore.)
4. L. gibba *L.* (cum antecedente eodem tempore.)
5. L. polyrrhiza *) *L.* (iisdem locis et eodem tempore.)

3. Fraxinus [*Esche*].

6. F. excelsior *L.* (in locis humidis inter dumeta passim prope Badendiek; Apr. Maj.)

4. Ligustrum [*Hartriegel, Rheinweide*].

7. L. vulgare *L.* (in dumetis, sponte auf der Schöninsel; Jun. Jul.)

5. Veronica [*Ehrenpreis*].

8. V. spicata *L.* (in apricis vor dem Primer copiose; Jul.)

*) imo polyrrhizos!

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0009
Mecklenburg Vorpommern

9. V. serpyllifolia *L.* — variat foliis ovatis et foliis ovato-subrotundis. — (in agris et locis humili gramine tectis frequens; Maj. in auctumn.)
10. V. scutellata *L.* (in paludibus, locis inundatis frequens; Jul. Aug.)
11. V. Anagallis *L.* (in fossis et paludibus frequens; Jul. Aug.)
12. V. Beccabunga *L.* [*Bachbungen*] (in fossis et rivulis: bei der Primer-Burg, ausserhalb der Gleviner Vorstadt, an der Nebel etc. Jun. Jul.)
13. V. officinalis *L.* (in locis siccis silvestribus copiose: in den Röwer-Tannen etc. Jun. Jul.)
14. V. Chamaedrys *L.* (in pomariis, pratis, pascuis, sepibus, nemoribus fere ubique; Maj. Jun.)
15. V. arvensis *L.* (in agris cultis et incultis, in ruderatis frequens; Maj. — Jul.)
16. V. agrestis *L.* (in agris, hortis, ruderatis frequens; April. — auctumn.)
17. V. hederaefolia *L.* (in hortis et agris cultis, vulgatissima; Mart. — Maj.)
18. V. triphyllos *L.* (in agris et hortis copiose; April.)
19. V. verna *L.* (in agris et pascuis arenosis copiose; April.)

6. Utricularia [*Wasserschlauch*].

20. U. vulgaris *L.* (in fossis paludosis, praecipue turfosis, frequens: an den Ellerbruch-Wiesen, bei den Bülower Eichen, in den Torfwiesen am Parumschen See etc. Jun. Jul.)
21. U. minor *L.* (in prato paludoso am Sumpfsee, raro; Jun.)

7. Lycopus [*Wolfsfuss, Zigeunerkraut*].

22. L. europaeus *L.* (in locis udis, ad fossas et rivu-

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0010
Mecklenburg Vorpommern

los ubique; e. c. bei Helenenlust, vor dem Gleviner Thor; Jul. Aug.)

8. Circaea [*Hexenkraut*].

23. C. lutetiana *L.* (in nemoribus humidis et umbrosis, copiose: in den Hasenhören, in dem Töpferkuhlenbruch, im Primer; Jul. Aug.)

9. Anthoxanthum [*Ruchgras*].

24. A. odoratum *L.* (in pratis, pascuis, nemoribus ubique; Maj. Jun.)

Classis III. Triandria.

10. Valeriana [*Baldrian*].

25. V. officinalis *L.* (ad ripas Nebulae, in locis humidis, fossis: am Langendammschen Wege, bei den Todten-Tannen etc. frequens; Jun. — Aug.)

26. V. dioica *L.* (in pratis udis ubique; Maj. Jun.)

11. Valerianella [*Rapünzchen, Feldsalat*].

27. V. dentata *De Candolle.* (inter segetes passim frequens: auf dem Bauhöfer Felde, am Wege nach Strenz etc. Jul. Aug.)

28. V. olitoria *Mönch.* — Valeriana Locusta *α. olitoria L.* (in cultis et campis sterilibus, copiose in vallo Hagemeisteri; April Maj.)

12. Montia [*Montie, Burzelkraut*].

29. M. fontana *L.* — *α.* minor *Koch.* Synops. p. 252. Rchb. Fl. exc. nr. 3715. (in locis humidis ad marginem agri auf dem Badendicker Felde, raro; Apr. — auctumn.)

13. Polycnemum [*Knorpelkraut*].

30. P. arvense *L.* (in arenosis: auf dem Felde rechts von Helenenlust, raro; Jul.) *John.*

14. Jris [*Schwertlilie*].

31. J. Pseudacorus *L.* (ad ripas Nebulae, in fossis

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0011
Mecklenburg Vorpommern

et paludibus vor dem Gleviner Thor et alibi satis frequens; Maj. Jun.)

15. Scirpus [*Binse*].

32. Sc. palustris *L.* (in pratis turfosis, fossis copiosissime: auf der Schanze, am Gutower See etc. Maj. Jun.)
33. Sc. uniglumis *Link.* (iisdem locis; Mai. Jun.)
34. Sc. acicularis *L.* (in locis inundatis: am Gutower See auf der Güstrower u. Badendieker Seite; Jul. Aug.)
35. Sc. Baeothryon *L.* (in pratis hieme inundatis am Gutower See rechts von der Gleviner Burg; Jun. Jul.)
36. Sc. lacustris *L.* (in lacubus copiosissime; Jul.)
37. Sc. glaucus *Smith.* (in fossis juxta Nebulam, nach der Primer-Burg hin, copiose; Jul.)
38. Sc. setaceus *L.* (in arenosis humidis: auf der Trift neben den Röwer-Tannen; Jul. Aug.)
39. Sc. silvaticus *L.* (in fossis et nemorosis humidis satis frequens: vor dem Gleviner Thor, in den Hasenhören etc. Jun. Jul.)
40. Sc. compressus *Persoon.* (in pratis humidis frequens: auf den Ellerbruch-Wiesen etc. Jun. Jul.)

16. Eriophorum [*Wollgras*].

41. E. vaginatum *L.* (in pratis et paludibus turfosis frequens: am Gutower See, hinter dem Heidberge, in den Röwer-Tannen; April.)
42. E. latifolium *Hoppe.* (in pratis uliginosis: am Sumpfsee; April — Jun.)
43. E. angustifolium *Roth.* (in pratis turfosis ubique; Maj. Jun.)

Gramineae [*Gräser*].

(praeter Anthoxanthum odoratum, quod vide supra.)

17. Nardus [*Borstengras*].

44. N. stricta *L.* (in pascuis aridis copiosissime: ne-

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0012
Mecklenburg Vorpommern

ben den Röwer-Tannen, vor dem Primer; Jun. — Aug.)

18. Digitaria [*Fingergras*].

45. D. filiformis *Köler.* — Panicum glabrum *Gaudin.* (in arenosis: an der Stelle des alten Kirchhofs vor dem Mühlenthor, am Wege nach der Primer-Burg; Aug.)

19. Echinochloa [*Stachelhirse*].

46. E. Crus galli *Palisot-de-Beauvois.* — Panicum Crus galli *L.* — α. spiculis submuticis. — β. spiculis aristatis. (in cultis: im Badendieker Pfarrgarten, an dem Feldwege rechts von Helenenlust und diesseits des Judenkirchhofs; Jul. Aug.)

20. Setaria [*Borstenhirse*].

47. S. viridis *Palisot-de-Beauvois.* — Panicum viride *L.* (in cultis; Jul. Aug.) α. humilis angustifolia. Rchb. Fl. exc. nr. 169. Agrostogr. Germ. Cent. I. nr. 1467. a. — et culmis decumbentibus. Schultes Oestr. Fl. I. p. 210. (in agris: vor dem Mühlenthor und bei Helenenlust.) β. procerior [nonnunquam bipedalis!] latifolia. Rchb. l. l. (auf dem Wall.)

21. Alopecurus [*Fuchsschwanzgras*].

48. A. pratensis *L.* (in pratis; Maj. Jul. Aug.) *John.*

49. * A. nigricans *Hornemann.* — Rchb. Fl. exc. nr. 185. Agrostogr. Germ. C. I. nr. 1479. (in einem Graben am Wege nach der Bülower Burg, am Wege nach dem Bauhofe, raro; Jun.)

50. A. geniculatus *L.* — α. radice fibrosa. (auf den Ellerbruch-Wiesen; Jul.) — β. radice bulbosa (in einem Graben am Wege zwischen der Glasewitzer Burg und Dehmen; Maj.)

51. A. fulvus *Smith.* — A. paludosus *P. B.* (in inundatis, ad paludes frequentissime; c. g. unmittelbar

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0013
Mecklenburg Vorpommern

vor dem Gleviner Thor zur Rechten; floret per totam fere aestatem.)

22. Leersia [*Leersie*].

52. * L. oryzoides *Swarz.* — Rchb. Fl. exc. nr. 201. Agrostogr. Germ. C. I. nr. 1495. (ad ripas Nebulae fossarumque vicinarum copiose; sed florentem semel tantum observavi ac legi aestate anni MDCCCXXXIV. calidissima; Aug.)

23. Phalaris [*Glanzgras*].

53. Ph. arundinacea *L.* (ad ripas Nebulae, rivulorum et fossarum, in nemorosis humidis — Hasenhören — frequentissime; Jun. Jul.)

24. Phleum [*Lieschgras*].

54. Ph. pratense *L.* (in pratis, pascuis, ad vias, vulgatissimum; Jun. Jul.)

55. Ph. Boehmeri *Wibel.* — Chilochloa Boehmeri *P. B.* (in locis editioribus arenosis: am Wege nach der Gleviner- und Bülower Burg; Jun. Jul.)

25. Milium [*Hirsegras*].

56. M. effusum *L.* (in nemorosis humidis: Hasenhören, Röwer-Tannen, Primer, frequentissime; Maj. Jun.)

26. Agrostis [*Windhalm*].

57. A. Spica-venti *L.* (inter segetes copiosissime; Jun. Jul.)

58. A. stolonifera *L.* — Reichenb. Fl. exc. nr. 139. Agrostogr. Cent. I. nr. 1430. Ex sententia cl. Meyeri (Chloris Hanov. p. 655 et 656.) A. alba *L.* (in pratis humidis: an der Nebel hinter der Gleviner Burg etc. Jun. — Aug.)

59. A. vulgaris *Withering.* (in arenosis ad vias, in collibus, agris sterilibus frequentissime: am Wege nach der Klus etc. Jun.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0014
Mecklenburg Vorpommern

60. A. canina *L.* — α. floribus purpurascentibus. — β. florib. stramineis. (Utraque forma conjuncta provenit in prato uliginoso an dem Schwarzen See; Jul. Aug.)

27. Calamagrostis [*Rohrgras*].

61. *C. Gaudiniana *Reichenbach.* — Arundo Calamagrostis *Gaud.* — Reichenb. Fl. exc. nr. 150. et apud Moesl. p. 120. Agrostogr. Germ. C. I. nr. 1447. (an einem Graben beim Rundholz, in dem h. Geist-Bruch und hinter demselben in den Wiesen am Gutower See, frequens; Jun. Jul.)

62. C. Epigeios *Roth.* — Arundo Ep. *L.* — (in arenosis siccis et in fossis: am Wege nach der Bülower Burg, nach Gutow und rechts von Helenenlust, in den Hasenhören; Jul. Aug.)

63. C. stricta *Palisot-de-Beauvois.* — Arundo stricta *Timm.* — (in pratis humidis: am Ochsenauge, am Gutower See; Jun. Jul.)

28. Phragmites [*Rohr, Schilf*].

64. Ph. communis *Trinius.* (in lacubus, piscinis, stagnis et fossis vulgatissimus; Aug.)

29. Arrhenatherum [*Glatthafer*].

65. A. avenaceum *Palisot-de-Beauvois.* (auf der Dom-Wiese; Jun. — Aug.)

30. Holcus [*Honiggras*].

66. H. lanatus *L.* (in pratis, versuris, nemusculis cet. fere ubique; Maj. — Jul.)

67. H. mollis *L.* (ad silvarum margines: Röwer Tannen, Heidberg; in nemusculis: Töpferkuhlenbruch; ad sepes, in versuris: Badendiek; antecedente rarior; Jun. Jul.)

31. Corynephorus [*Keulengras*].

68. C. canescens *Palisot-de-Beauvois.* — Aira cane-

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0015
Mecklenburg Vorpommern

scens *L.* — (in arenosis copiosissime: am Wege nach der Gleviner Burg, am Heidberge, am Wege nach der Primer-Burg etc. Jun. — Aug.)

32. Aira [*Schmiele*].

69. A. cespitosa *L.* (in pratis humidis turfosis et in nemoribus frequens: bei der Schanze, beim Brunnen, in den Hasenhören etc. Jun. — Aug.)

70. A. flexuosa *L.* (in silvis copiosissime: am Heidberge, in den Röwer-Tannen, im Primer; Jul. Aug.)

71. A. caryophyllea *L.* (in campis arenosis bei der Gleviner Burg, hinter den Bülower Eichen et alibi copiosissime; Maj. Jun.)

33. Avena [*Hafer*].

72. A. pubescens *L.* (in pratis et locis editioribus: in den Ellerbruch-Wiesen, in dem Hohlwege zwischen Güstrow und der Bülower Burg etc. Jun. Jul.)

73. A. pratensis *L.* (auf den Bauhöfer Wiesen bei der Schanze; Jul. Aug.) *John.*

74. *A. flavescens *L.* — Rchb. Fl. exc. nr. 346. Agrostogr. Germ. C. I. nr. 1694. (auf einer Wiese und am Wege bei der Schanze, infrequens; Jun.)

34. Melica [*Perlgras*].

75. M. nutans *L.* (in nemoribus: in den Hasenhören und im Primer, frequens; Maj. Jun.)

76. M. uniflora *Retzius.* (frequens cum antecedente; Maj. Jun.)

35. Molinia [*Steifhalm*].

77. M. coerulea *Mönch.* (in nemorosis humidis, pratis paludosis et umbrosis, frequens in den Todten-Tannen und in einem Sumpfe in den Röwer-Tannen; Jul. Aug.)

36. Glyceria [*Mannagras*].

78. G. aquatica *Wahlenberg.* — G. spectabilis *M. et*

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0016
Mecklenburg Vorpommern

K. (ad ripas Nebulae, in fossis et piscinis frequens; Jul. Aug.)

79. G. fluitans *Rob. Brown.* (in fossis, paludibus, locis inundatis frequentissime: bei der Schanze etc. Jun. — Aug.)

80. G. distans *Wahlenberg.* (an der neuen Promenade; Jun. — Aug.)

81. G. airoides *Reichenbach.* — G. aquatica *Presl.* Catabrosa aquatica *P. de B.* (ad fontes, rivulos, paludes passim: in der Nähe des Gutower Sees et alibi; Jul.)

37. Poa [*Rispengras*].

82. P. annua *L.* (in hortis, pascuis, nemoribus, ad vias, quin imo in urbis plateis, vulgatissima; floret per totam aestatem.)

83. P. trivialis *L.* (ad vias, in pratis paludosis: an der neuen Promenade etc. Jun. Jul.)

84. P. pratensis *L.* (in pratis ubique; Jun.)

85. P. serotina *Ehrhart.* — P. fertilis *Host.* — (an der neuen Promenade, raro; Jul. Aug.)

86. P. nemoralis *L.* (in lucis et nemoribus, ad sepes copiosissime; Jun. — Aug.)

87. P. compressa *L.* (in locis editioribus, ad vias satis frequens: in dem Hohlwege diesseits der Bülower Eichen, am Wege nach der Bülower Burg etc. Jun. Jul.)

38. Briza [*Zittergras*].

88. B. media *L.* (in pratis et pascuis frequentissime: auf den Ellerbruch-Wiesen etc. Jun.)

39. Cynosurus [*Kammgras*].

89. C. cristatus *L.* (iisdem locis frequentissime; Jun.)

40. Dactylis [*Knauelgras*].

90. D. glomerata *L.* (in pratis, pomariis, nemoribus, ad vias, sepes ubique; Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0017
Mecklenburg Vorpommern

41. Festuca [*Schwingel*].

91. F. ovina *L.* — β. F. tenuifolia *Sibthorp.* (am Heidberge copiose; Maj. Jun.)
92. F. duriuscula *L.* (*John;* ipse non vidi vel praetermisi.)
93. F. rubra *L.* (in pratis, pascuis, locis editioribus, silvis frequens: am Wege nach der Gleviner Burg etc. Jul. Aug.)
94. F. nemorum *Leysser.* — mera praecedentis varietas umbrosa, judice Reichenbach. Fl. exc. nr. 254. — (in den Röwer-Tannen; Jul.)
95. F. arundinacea *Schreber.* (in locis humidis, ad fossas: bei der Schanze etc. Jun.)
96. F. pratensis *Hudson.* (in pratis et pascuis; Jun. Jul.)
97. *F. silvatica *Villars.* — Rchb. Fl. exc. nr. 259. Agrostogr. Germ. C. I. nr. 1562. — (im Primer, frequens; Jun. Jul.)

42. Triodia [*Dreizahn*].

98. T. decumbens *Palisot-de-Beauvois.* (in silvis et campis aridis frequens: in und vor den Röwer-Tannen etc. Jul.)

43. Bromus [*Trespe*].

99. B. giganteus *L.* — Festuca gigantea *Vill.* (in nemoribus humidis umbrosis ubique; Jun. — Aug.)
100. B. secalinus *L.* (inter segetes; Jun. — Aug.)
101. B. mollis *L.* (in pascuis et agris vulgaris; Jul.)
102. B. arvensis *L.* (ad vias: nach den Bülower Eichen, vor der Gleviner Burg et alibi non rarus; Jun. Jul.)
103. B. sterilis *L.* (ad vias frequentissime; Jun. — Sept.)

44. Brachypodium [*Zwenke*].

104. B. gracile *Palisot-de-Beauvois.* — B. silvaticum

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0018
Mecklenburg Vorpommern

Roemer et Schultens. — (in nemoribus: Hasenhören, Töpferkuhlenbruch, Primer, et inter dumeta: am Südabhange der Schöninsel, an einem ähnlichen am Nordende des Parumschen Sees; Jul.)

45. Agropyrum [*Queckengras*].

105. A. repens *Pal.-de-Beauv.* — Triticum repens *L.* — *α.* flosculis acutis vel acuminatis. — *β.* flosc. plus minus aristatis. (in cultis, sepibus, vulgatissimum; Jun. — Aug.)

46. Lolium [*Lolch*].

106. L. perenne *L.* — *β. tenue.* — *γ. ramosum* Rchb. Fl. exc. nr. 69. — (ad vias et margines agrorum ubique; floret per totam aestatem.)

107. L. temulentum *L.* (inter segetes; Jun. Jul.) *John;* ipse in agro nostro nondum reperi.

47. Elymus [*Haargras*].

108. *E. europaeus *L.* — Rchb. Fl. exc. nr. 78. Agrostograph. Germ. C. I. nr. 1359. — (in nemorosis: vorn in dem Töpferkuhlenbruch raro; Jul.)

48. Hordeum [*Gerste*].

109. H. murinum *L.* (ad vias, muros, parietes, vulgatissimum; Jun. — Aug.)

---

49. Holosteum [*Spurre*].

110. H. umbellatum *L.* (in campis et aggeribus copiose, c. c. auf dem Wall; Mart. — Maj.)

Classis IV. Tetrandria.

50. Scabiosa [*Scabiose*].

111. Sc. succisa *L.* [*Teufelsabbiss*] Succisa pratensis *Mönch.* (in pratis et silvaticis: am Wege zwischen den Ellerbruch-Wiesen, in den Röwer-Tannen; Aug. Sept.)

112. Sc. Columbaria *L.* (in campis, collibus siccis:

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0019
Mecklenburg Vorpommern

am Wege nach der Bülower Burg und vor dem Primer; Jul. Aug.)

113. Sc. arvensis *L.* (in agris et silvis, ad vias ubique; Jun. — Aug.) Occurrit saepe capitulis proliferis.

51. Sherhardia [*Sherhardie*].

114. S. arvensis *L.* (inter segetes, frequens prope Gantschow; Jun. — Aug.)

52. Asperula [*Waldmeister*].

115. A. odorata *L.* (in nemoribus, copiosissime im Primer; Maj. Jun.)

53. Galium [*Labkraut*].

116. G. Aparine *L.* (in nemoribus, sepibus, dumetis vulgare; Jun. Jul.)

117. G. uliginosum *L.* (in fossis, pratis muscosis turfosis vulgare; Jun. Jul.)

118. G. palustre *L.* (in fossis et paludibus ubique; Jun. — Aug.)

119. G. Mollugo *L.* (in pratis siccioribus, ad vias, in silvaticis vulgare; Maj. — Aug.)

120. G. verum *L.* (*John;* sed a me in agro nostro frustra quaesitum.)

121. G. silvaticum *L.* (in silvis frequens: Töpferkuhlenbruch, Primer; Jun. Jul.)

54. Plantago [*Wegerich*].

122. P. major *L.* (ad vias, in agris, graminosis, silvis vulgaris; Jun. — Sept.)

123. P. media *L.* (in pascuis, ad vias: ausserhalb der Gleviner Vorstadt; Jun. — Aug.)

124. P. lanceolata *L.* (ad vias, in pratis, silvis ubique; Jun. — Aug.)

55. Centunculus [*Kleinling*].

125. C. minimus *L.* (in agro humido argillaceo-arenoso am Wege von Badendiek nach Rosin; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0020
Mecklenburg Vorpommern

56. Cornus [*Hornstrauch*].

126. C. sanguinea *L.* (in dumetis et ad sepes frequens, e. c. am Langendammschen Wege, bei den Bülower Eichen, am Wege nach der Bülower Burg, beim Brunnen; Jun. Jul.)

57. Majanthemum [*Schattenblume*].

127. M. bifolium *De Candolle.* (in silvestribus, nemorosis frequens: Röwer-Tannen, Primer; Maj. Jun.)

58. Alchemilla [*Löwenfuss*].

128. A. vulgaris *L.* [*Frauenmantel, Alchimistenkraut.*] (in pascuis, pratis prope Badendiek frequens; Maj. Jun.)

129. A. arvensis *Scopoli.* (in agris argillosis: auf dem Bauhöfer Felde nach dem Gutower See hin, et alibi frequens; Jun. — in auctumn.)

59. Jlex [*Stechpalme, Hülsen*].

130. J. Aquifolium *L.* (im Primer, frequens; Maj. Jun.)

60. Potamogeton [*Laichkraut*].

131. P. natans *L.* (in fossis, lacubus, stagnis ubique: im Sumpfsee, in dem Scheidegraben zwischen dem Bauhöfer Felde und der Dom-Wiese etc. Jul. Aug.)

132. P. fluitans *Roth.* (in fossis juxta Nebulam nach der Primer-Burg hin; Jul. Aug.)

133. P. gramineus *L.* — P. heterophyllus *Schreber.* — (am Rande des Gutower Sees frequens; Jul. Aug.)

134. P. lucens *L.* (im Sumpfsee und dem nr. 131. genannten Scheidegraben, copiose; Jul Aug.)

135. P. praelongus *Wullfen.* (im Sumpfsee, in dem Abfluss des Gutower Sees bei Helenenlust; Jul. Aug.)

136. P. perfoliatus *L.* (in lacubus et aquis lente fluentibus: Gutower See, Nebel, Mühlenbach an der Pramstrasse etc. vulgaris; Jul. Aug.)

137. P. crispus *L.* (in Nebula fluvio et in fossis frequens; Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0021
Mecklenburg Vorpommern

138. P. acutifolius *Link.* (im Sumpfsee; Jul. Aug.)
139. P. compressus *L.* (in fossis et fluviis ubique; Jul. Aug.)
140. P. pusillus *L.* (in fossis et lacubus: im Sumpfsee, in den Gräben der Mühlen-Wiese etc. Jul. Aug.)
141. P. pectinatus *Smith.* (in Nebula fluvio; Jul. Aug.)

61. Sagina [*Mastkraut*].

142. S. procumbens *L.* (in agris, pascuis, locis graminosis subhumidis satis frequens: bei Helenenlust etc. Maj. — auctumn.)

62. Radiola [*Zwergflachs*].

143. R. linoides *Gmelin.* — R. millegrana *Smith.* — (in arenosis humidis: auf der Trift am Ende der Röwer-Tannen, frequens auf dem Badendieker Felde; Jul. Aug.)

Classis V. Pentandria.

63. Myosotis [*Vergissmeinnicht*].

144. M. palustris *Withering.* (in fossis et paludibus ubique; Maj. — Sept.)
145. M. intermedia *Link.* (in locis editioribus ad vias ubique; Jun.)
146. M. collina *Ehrhart.* (in locis editioribus aggeribusque frequens: auf dem Wall etc. Maj.)
147. M. versicolor *Roth.* (in agris et pascuis, frequens: bei Helenenlust, auf dem Gutower Felde etc. Maj. Jun.)
148. M. arvensis *Sibthorp.* (in agris arenosis vulgaris; Maj. — Aug.)

64. Lithospermum [*Steinsaame*].

149. L. arvense *L.* (in agris ubique; April. Maj.)

65. Anchusa [*Ochsenzunge*].

150. A. officinalis *L.* — var. flor. alb. (in agris, ad vias ubique; Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0022
Mecklenburg Vorpommern

66. Lycopsis [*Krummhals*].

151. L. arvensis *L.* (in agris ubique; Jun. — Aug.)

67. Cynoglossum [*Hundszunge*].

152. C. officinale *L.* (ad vias, in ruderatis, vulgaris; Maj. Jul.)

68. Pulmonaria [*Lungenkraut*].

153. P. officinalis *L.* (in nemorosis copiosissime; April.)

69. Symphytum [*Beinwell*, *Schwarzwurz*].

154. S. officinale *L.* — var. flor. albis. (ad ripas Nebulae et in fossis: an der neuen Promenade etc. frequens; Maj. Jun.)

70. Asperugo [*Schärfling*, *Scharfkraut*].

155. A. procumbens *L.* (vor dem Mühlen-Thore am Graben bei dem Töpferhause, vor dem Hageböcker Thore links von der Brücke, auf dem Badendicker Kirchhofe; Jun.)

71. Echium [*Natterkopf*].

156. E. vulgare *L.* (in arvis et ruderatis, ad vias vulgare; Jun. Jul.)

72. Primula [*Schlüsselblume*].

157. P. veris *L.* — P. officinalis *Jacquin.* — (in solo pingui inter fruticeta: Hasenhören, Töpferkuhlenbruch, am Wege nach der Bülower Burg et alibi frequens; April. Maj.)

73. Menyanthes [*Zottenblume*, *Fieberklee*].

158. M. trifoliata *L.* (in fossis et pratis paludosis ubique, e. g. vor dem Gleviner Thor; Maj. Jun.)

74. Hottonia [*Wasserfeder*].

159. H. palustris *L.* (in fossis et paludibus frequens, e. g. bei der Schanze; Maj. Jun.)

75. Lysimachia [*Lysimachie*].

160. L. vulgaris *L.* — var. fol. oppositis. — (ad ripas

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0023
Mecklenburg Vorpommern

Nebulae et lacuum, in pratis silvaticis frequens; Jul. Aug.)

161. L. thyrsiflora *L.* (in palude turfosa in den Röwer-Tannen; Jul. Aug.)

162. L. Nummularia *L.* (in pratis et nemorosis humidis, ad fossarum margines ubique; Jun. — Aug.)

76. Anagallis [*Gauchheil*].

163. A. arvensis *L.* (in agris ubique; Jun. — Aug.)

77. Convolvulus [*Winde*].

164. C. arvensis *L.* (in agris ubique; floret per totam aestat.)

165. C. sepium *L.* (in sepibus, nemusculis humidis vulgaris; Jul. Aug.)

78. Jasione [*Jasione*].

166. J. montana *L.* (in arenosis et pascuis siccioribus ubique; Jul. Aug.)

79. Campanula [*Glockenblume*].

167. C. rotundifolia *L.* (in pascuis, collibus, locis silvestribus, vulgaris; Jun. Jul.)

168. C. patula *L.* (in graminosis humidis umbrosis frequens: beim Brunnen etc. Jun. Jul.)

169. C. persicifolia *L.* (in locis editioribus siccis frequens, e. c. am Wege nach der Bülower Burg, bei den Bülower Eichen; Jul. Aug.)

170. C. Trachelium *L.* (in nemoribus, inter dumeta frequens: Hasenhören, beim Brunnen etc. Jul. Aug.)

171. C. rapunculoides *L.* (inter frutices: in der Anlage des Jahnschen — ehemals Boldtschen — Gartens, rarior; Jul.)

172. C. glomerata *L.* (in silvestribus, e. c. in den Gulen-Tannen bei der Primer-Burg; Jul. Aug.)

80. Phyteuma [*Rapunzel*].

173. Ph. spicatum *L.* (in nemorosis frequens: Hasenhören, Töpferkuhlenbruch etc. Maj. Jun.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0024
Mecklenburg Vorpommern

81. Lonicera [*Specklilie*].

174. L. Periclymenum *L.* [*Deutsches Geisblatt.*] (in silvis et nemoribus, inter dumeta: Röwer-Tannen, Primer etc. copiosissime; Jun. Jul.)

82. Verbascum [*Wollkraut*].

175. V. thapsiforme *Schrader.* (in agris: zwischen dem Bauhofe und Gutow, auf der Schöninsel, copiosissime; Jul. Aug.)

176. V. nigrum *L.* (ad vias et sepes ubique; Jul. Aug.)

83. Datura [*Stechapfel*].

177. D. Stramonium *L.* (in ruderatis, sed non quotannis iisdem locis; vidi et legi: vor dem Gleviner Thor, in der Hageböcker Vorstadt, auf dem Wall; Jul. Aug.)

84. Hyoscyamus [*Bilsenkraut*].

178. H. niger *L.* (in ruderatis et locis incultis, sed non semper iisdem: am Wege nach der Schöninsel bei der Brücke, an der Krankenkoppel bei der Ziegelei, auf dem Badendieker Kirchhofe etc. Jun.)

85. Solanum [*Nachtschatten*].

179. S. Dulcamara *L.* (in locis humidis silvarum, ad latera paludum et ripas Nebulae, vulgaris; Jul. Aug.)

180. S. nigrum *L.* (in cultis et incultis vulgatissimum; Jul. Aug.)

181. S. humile *Bernhardi.* (Jndicavit *John;* sed ipse non vidi.)

86. Erythraea [*Tausendgüldenkraut*].

182. E. Centaurium *Persoon.* (in pascuis et limitibus agrorum frequens, e. c. am Wege vor dem Mühlen-Thore, an den Gräben der Viehweide vor den Röwer-Tannen etc. Jul. Aug.)

183. E. pulchella *Fries.* (in prato humido am Gutower See auf der Badendieker Seite, rarior; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0025
Mecklenburg Vorpommern

87. Rhamnus [*Kreuzdorn*].

184. Rh. catharticus *L.* (in dumetis, ad silvarum oras frequens: in dem Hohlwege diesseits der Bülower Burg, beim Brunnen etc. Maj. Jun.)

185. Rh. Frangula *L.* [*Faulbaum.*] (in silvis et pratis turfosis copiosissime: Röwer-Tannen; Maj. Jun.)

88. Evonymus [*Spindelbaum*].

186. E. europaeus *L.* (in silvis et dumetis frequens, e. g. in dem Hohlwege diesseits der Bülower Burg; Maj. Jun.)

89. Ribes [*Johannisbeere*].

187. R. rubrum *L.* [*Johannisbeere*] (in silvarum locis humidiusculis, e. c. in den Hasenhören. Var. baccis flavescentibus: ib. April. Maj.)

188. R. nigrum *L.* [*Gichtbeere*] (in locis humidis silvarum, circum paludes: vor dem Töpferkuhlenbruch, im Primer; April. Maj.)

189. R. Grossularia *L.* [*Stachelbeere*] (ad sepes et in silvis passim: e. c. an Sibeths Werder, auf dem Heidberge etc. April. Maj.)

90. Viola [*Veilchen*].

190. V. palustris *L.* (in paludibus cespitosis, pratis turfosis ubique: Röwer-Tannen, Brunnen etc. Maj. Jun.)

191. V. hirta *L.* (in pascuis, ad fruticeta: am Wege nach der Bülower-Burg, nach Gutow et alibi frequens; Maj.)

192. V. odorata *L.* (in graminosis auf dem Wall und auf der Schöninsel copiose; Maj.)

193. V. mirabilis *L.*, quam b. Hahnius indicavit in Dethard. Consp. p. 22., adhuc et a me et ab aliis botanophilis in nostro agro frustra quaesita est.

194. V. canina *L.* — Varietas major: *lucorum Rchb.;*

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0026
Mecklenburg Vorpommern

var. minor: *V. ericetorum Schrader.* (in ericetis, locis siccis, ad silvarum oras frequentissime, e. g. bei der Rennbahn; Maj. Jun.)

195. V. silvestris *Lamarck.* — β. *V. Riviniana Rchb.* (in nemoribus, silvis, dumetis frequentissime, e. g. im Primer; Apr. Maj.)

196. V. tricolor *L.* — α. *vulgaris;* β. *arvensis Koch.* Synops. Fl. Germ. p. 87. (α. in arenosis frequentissime, e. c. bei der Gleviner Burg; β. inter segetes, in campis sterilibus ubique; Maj. — Oct.)

91. Impatiens [*Balsamine, Springsaamenkraut*].

197. I. Noli tangere *L.* (in nemorosis humidis frequens: Hasenhören, Primer; Jul. Aug.)

92. Hedera [*Epheu*].

198. H. Helix *L.* (in silvis vulgaris; floret primo autumno, sed in patria florentem non vidi.)

93. Herniaria [*Bruchkraut*].

199. H. glabra *L.* (in campis arenosis, glareosis, siccis vulgaris; Jul. — Sept.)

94. Chenopodium [*Gänsefuss*].

200. Ch. Bonus Henricus *L.* (in ruderatis, locis incultis passim: bei der Ziegelei, vor dem Gleviner Thor, am Heidberge vorn in den Tannen; Jun. — Aug.)

201. Ch. hybridum *L.* (in cultis et incultis ad vias: vor dem Mühlen- und Hageböker Thor; Jul. Aug.)

202. Ch. urbicum *L.* (in ruderatis, ad vias, circum fimeta, ibid. Aug. Sept.)

203. Ch. rubrum *L.* (iisdem locis vulgare; Aug. Sept.)

204. Ch. murale *L.* (ad muros, parietes, in ruderatis, circum fimeta vulgare; Aug. Sept.)

205. Ch. album *L.* (in hortis, agris, ruderatis planta vulgatissima; Aug. Sept.)

206. Ch. glaucum *L.* (in locis humidis, inundatis co-

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0027
Mecklenburg Vorpommern

piose: vor dem Gleviner Thore, an der ehemaligen Gerichtsstelle etc. Jul. Aug.)

207. Ch. polyspermum *L.* (in agris beim Brnnnen; Jul. Aug.) *John.*

95. Atriplex [*Melde*].

208. A. patula *L.* (in ruderatis, cultis, ad sepes et vias ubique; Aug.)

209. A. angustifolia *Smith.* (in hortis, ruderatis, ad vias ubique; Aug. Sept.)

210. A. hortensis *L.*, quamquam non indigena, tamen, per ejectamenta urbis et hortorum propagata, non raro occurrit in ruderatis et ad vias; Aug.)

96. Ulmus [*Ulme*, *Rüster*].

211. U. campestris *L.* (in silvis: Primer; April.)

212. U. ciliata *Ehrhart.* — U. effusa *Willdenow.* — (in silvis: Hasenhören; April.)

97. Cuscuta [*Flachsseide*].

213. C. europaea *L.* (in dumetis et sepibus, parasitica, praecipue in Humulo Lupulo et Urtica dioica: e. c. vor dem Gleviner Thor in der Nähe der Windmühle; Aug.)

214. C. Epilinum *Weihe.* (in Lino usitatissimo parasitica: auf dem Bölkower Felde; Jul. Aug.)

98. Gentiana [*Enzian*].

215. G. campestris *L.* (in pascuis: vor den Röwer-Tannen, bei der Rennbahn; Sep. Oct.)

99. Daucus [*Mohrrübe*, *Möhre*].

216. D. Carota *L.* (in pascuis et pratis copiose: am Wege nach der Bülower Burg, am Langendammschen Wege etc. Jun. — Aug.)

100. Torilis [*Borstdolde*].

217. T. Anthriscus *Gmelin.* (ad vias, dumeta et sepes cet. ubique; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0028
Mecklenburg Vorpommern

101. Heracleum [*Bärenklau*].

218. H. Sphondylium *L.* (in pratis, ad sepes et dumeta ubique; Jul. Aug.)

102. Pastinaca [*Pastinak*].

219. P. sativa *L.* (in graminosis, agrorum limitibus frequens: am Wege nach der Bülower Burg und am Langendammschen Wege; Jul. Aug.)

103. Thysselinum [*Sumpfsilge*].

220. Th. palustre *Hoffmann.* — Peucedanum palustre *Mönch.* (in pratis paludosis, ad fossas: an der neuen Promenade; Jul. Aug.)

104. Peucedanum [*Haarstrang*].

221. P. Oreoselinum *Mönch.* [*Bergsilge, Grundheil*] (in locis editioribus apricis et silvestribus: am Wege nach der Bülower Burg und in den Röwer-Tannen; Jul. Aug.)

105. Archangelica [*Engelwurz*].

222. A. officinalis *Hoffmann.* (ad ripas Nebulae et fossarum, e. g. an den Langen Stegen, frequentissime; Jul. Aug.)

106. Angelica [*Angelika*].

223. A. silvestris *L.* (in locis humidis silvarum: Hasenhören; Jul. Aug.) *John.*

107. Selinum [*Silge*].

224. S. Carvifolia *L.* (in locis humidis silvarum: Todtentannen, Röwer-Tannen; Jul. Aug.)

108. Oenanthe [*Rebendolde*].

225. Oe. fistulosa *L.* (in fossis frequens, e. g. an der neuen Promenade, bei Helenenlust etc. Jun. — Aug.)

226. Oe. Phellandrium *Lamarck.* (in fossis et paludibus, e. g. bei der Schanze; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0029
Mecklenburg Vorpommern

109. Aethusa [*Gleisse*].

227. Ae. Cynapium *L.* (in cultis et ruderatis, vulgatissima; Jun. in auctumn.)

110. Sium [*Merk*].

228. S. latifolium *L.* (in aquis stagnantibus et lente fluentibus ubique, e. c. bei der Schanze; Jul. Aug.)

111. Berula [*Berle*].

229. B. augustifolia *Koch.* (in fossis et rivulis: in den Gräben der Mühlen-Wiese, beim Sumpfsee etc. Jul. Aug.)

112. Pimpinella [*Bibernell*].

230. P. magna *L.* (in pratis et locis humidis graminosis nemorum: am Gutower See, im Töpferkuhlenbruch; Maj. Jun.)

231. P. Saxifraga *L.* — α. *major.* — β. *dissectifolia Koch.* Synops. p. 287. (in pascuis, collibus incultis: am Wege nach der Gleviner Burg, diesseits der Rennbahn etc. copiose; Jul. Aug.)

113. Carum [*Kümmel*].

232. C. Carvi *L.* (in pratis et pascuis: bei der Schanze und beim Bauhofe; Maj. Jun.)

114. Aegopodium [*Giersch*].

233. Ae. Podagraria *L.* (in locis subhumidis ad dumeta et sepes, in pomariis ubique; Jun. Jul.)

115. Helosciadium [*Sumpfdoldchen*].

234. H. repens *Koch.* (in locis paludosis, ad fossarum margines, e. g. auf der Mühlen-Wiese und auf dem Schweinsbrink in der Nähe der Ueberfall-Wiese, frequentissime; Jul. Aug.)

116. Cicuta [*Wasserschierling, Wütherich*].

235. C. virosa *L* — β. *tenuifolia Koch.* Synops. p. 282. (in fossis et paludibus profundis, e. g. auf den

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0030
Mecklenburg Vorpommern

Ellerbruch-Wiesen; β. in locis inundatis: am Sumpfsee; Jul. Aug.)

117. Chaerophyllum [*Kälberkropf*].

236. Ch. temulum *L.* (in dumetis, locis incultis et nemorosis ubique; Jun. Jul.)

118. Anthriscus [*Klettenkerbel*].

237. A. silvestris *Hoffmann.* (in pratis, ad sepes, inter dumeta ubique; Maj. Jun.)

238. A. Cerefolium *Hoffm.* (olim in locis incultis vor dem Hageböcker Thor, links am Stadtgraben; hortorum aufuga! Maj. Jun.)

239. A. vulgaris *Persoon.* (in locis incultis, ad vias et sepes: von der Gleviner Vorstadt bis zum Heidberge; Maj. Jun.)

119. Conium [*Gefleckter Schierling*].

240. C. maculatum *L.* (ad vias: nach dem Bauhofe und der Bülower Burg hin copiose; Jul. Aug.)

120. Sanicula [*Sanickel*].

241. S. europaea *L.* (in nemoribus umbrosis subhumidis frequens, e. g. in den Hasenhören; Maj. Jun.)

121. Hydrocotyle [*Wassernabel*].

242. H. vulgaris *L.* (in locis paludosis frequentissime, e. c. in einem Sumpfe der Röwer-Tannen, am Gutower und Sumpfsee etc. Jun.)

122. Viburnum [*Schneeball*].

243. V. Opulus *L.* (in subhumidis inter dumeta, ad silvarum oras: beim Brunnen, in den Hasenhören, Röwer-Tannen; Maj. Jun.)

123. Sambucus [*Hollunder*].

244. S. nigra *L.* (in silvis et sepibus, frequens beim Brunnen; Jun. Jul.)

124. Parnassia [*Einblatt*].

245. P. palustris *L.* (in pratis ubique; Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0031
Mecklenburg Vorpommern

125. Armeria [*Grasnelke*].

246. A. vulgaris *Willdenow.* (in pascuis, aggeribus, ad vias ubique; Jun. — Aug.)

126. Linum [*Lein*].

247. L. catharticum *L.* (in pratis et pascuis ubique; Jun. — Aug.)

127. Drosera [*Sonnenthau*].

248. D. rotundifolia *L.* (in uliginosis et paludibus cespitosis, Sphagno repletis, e. g. in den Röwer-Tannen; Jul. Aug.)

249. D. longifolia *L.* — D. anglica *Hudson.* — (ibid. Jul. Aug.)

128. Myosurus [*Mäuseschwanz*].

250. M. minimus *L.* (in locis hieme inundatis: auf Aeckern am Gutower See, bei der Rothen Brücke; Maj. Jun.)

Classis VI. Hexandria.

129. Allium [*Lauch*].

251. A. Scorodoprasum *L.* (in graminosis am Wege nach der Bülower Burg; Jun. Jul.)

252. A. oleracerum *L.* (in dumetis, ad margines agrorum et viarum: am Wege nach der Bülower und Gleviner Burg et alibi frequens; Jul. Aug.)

130. Ornithogalum [*Vogelmilch*].

253. O. stenopetalum *Fries.* (in agris, agrorum fossarumque marginibus: am Langendammschen Wege und am Wege nach der Bülower Burg; April.)

254. O. arvense *Persoon.* (in agris ubique; April.)

255. O. luteum *L.* (in locis graminosis fertilibus nemorum et inter frutices: beim Brunnen, in den Hasenhören etc. April.) Variat foliis binis.

256. O. nutans *L.* (auf dem Wall und an Sibeths Camp; April.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0032
Mecklenburg Vorpommern

131. Anthericum [*Strausslilie*].

257. A. ramosum *L.* (in den Röwer-Tannen; raro; Jul.)

132. Asparagus [*Spargel*].

258. A. officinalis *L.* (in silvis et dumetis: Röwer-Tannen, unterhalb des Heidberges, auf der Schöninsel; Jun. Jul.)

133. Convallaria [*Maiblume*].

259. C. majalis *L.* (in nemoribus umbrosis, copiosissime im Primer; Maj.)

260. C. multiflora *L.* (in nemoribus, inter frutices: Hasenhören, Primer; Maj. Jun.)

134. Acorus [*Kalmus*].

261. A. Calamus *L.* (in fossis et paludibus, e. g. vor dem Gleviner Thor; Jun. Jul.)

135. Juncus [*Simse*].

262. J. conglomeratus *L.* (ad paludes et fossas: in den Torfwiesen am Parumschen See etc. Jun. Jul.)

263. J. effusus *L.* (iisdem locis frequens; Jun. — Aug.)

264. J. glaucus *Ehrhart.* (iisdem locis ubique; Jun. — Aug.)

265. J. squarrosus *L.* (in cespitosis et pratis uliginosis, e. g. bei den Röwer-Tannen und am Schwarzen See; Jun. — Aug.)

266. J. compressus *Jacquin.* (abundat in pratis et pascuis humidis; Jun. Jul.)

267. J. bufonius *L.* (in locis humidis, vulgatissimus; Jun. — Aug.)

268. J. obtusiflorus *Ehrhart.* (in fossis turfosis auf den Wiesen am Parumschen See; Jun. Jul.)

269. J. alpinus *Villars.* Reichenb. Fl. exc. nr. 652. (ad lacuum margines frequens: Gutower und Sumpfsee; Jun. — Aug.)

270. J. lamprocarpos *Ehrhart.* (in pratis paludosis, ad

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0033
Mecklenburg Vorpommern

fossas, in locis inundatis frequens: Ellerbruch-Wiesen, beim Sumpfsee etc. Jun. Jul.)

271. J. acutiflorus *Ehrhart.* (Indicavit *John*, sed a me nusquam repertus est.)

272. J. supinus *Mönch.* — J. uliginosus *Roth.* — (*John;* sed mihi non constat.)

136. Luzula [*Hainsimse*].

273. L. pilosa *Gaudin.* — L. vernalis *De Candolle.* — (in silvis nemoribusque siccis graminosis vulgaris; Mart. April.)

274. L. campestris *De Candolle.* (in campis et aggeribus ubique; Mart. — Maj.)

275. L. multiflora *Lejeune.* (in loco editiore in den Röwer-Tannen; April. Maj.)

137. Berberis [*Berberitze, Sauerdorn*].

276. B. vulgaris *L.* (in dumetis am Wege nach der Bülower Burg; sed, quod jam Dethardingius monuit, vix indigena. Maj. Jun.)

138. Peplis [*Peplis*].

277. P. Portula *L.* (in loco hieme inundato auf dem Badendieker Felde copiose; Jul. Aug.)

139. Rumex [*Ampfer*].

278. R. crispus *L.* (in agris, pratis, pascuis, fossis, ad vias vulgaris; Jul. Aug.)

279. R. obtusifolius *L.* (in locis siccis et humidis, in silvis, ruderatis, ad sepes, pagos vulgaris; Jul. Aug.)

280. R. nemorosus *Schrader.* (in nemoribus subhumidis umbrosis: Töpferkuhlenbruch, Primer, frequens; Jul. Aug.)

281. R. Nemolapathum *Ehrhart.* (in locis humidis, fossis; Jul. Aug.) *John.*

282. R. maritimus *L.* (ad paludes et fossas: vor dem Gleviner Thor und bei Helenenlust; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0034
Mecklenburg Vorpommern

283. R. Hydrolapathum *Hudson.* (in Nebula fluvio, in lacubus et fossis, e. c. vor dem Gleviner Thor; Jul. Aug.)

284. R. Acetosa *L.* (in pomariis, pratis, pascuis humidis vulgaris; Maj. Jun.)

285. R. Acetosella *L.* (in arvis, silvis, pascuis arenosis vulgatissimus; Maj. Jun.)

140. Scheuchzeria [*Scheuchzerie*].

286. Sch. palustris *L.* (in uliginosis: auf dem kleinen Moore in den Röwer-Tannen, raro; Maj. Jun.)

141. Triglochin [*Dreizack*].

287. Tr. palustre *L.* (in pratis uliginosis ubique, e. c. auf den Ellerbruch-Wiesen, am Sumpfsee; Jun. Jul.)

288. Tr. maritimum *L.* (iisdem locis cum praecedente; Jun. — Aug.)

142. Alisma [*Froschlöffel*].

289. A. Plantago *L.* — β. *A. lanceolata Withering.* (in aquis stagnantibus, fossis cet. fere ubique; β. am Rande des Gutower Sees; Jun. — Aug.)

Classis VII. Heptandria.

143. Trientalis [*Trientale, Siebenstrahl*].

290. Tr. europaea *L.* (im Primer; Maj. Jun.)

Classis VIII. Octandria.

144. Epilobium [*Weiderich*].

291. E. angustifolium *L.* (in silvis, e. g. Röwer-Tannen; Jul. Aug.)

292. E. hirsutum *L.* (in fossis, e. g. an der Krankenkoppel; Jul. Aug.)

293. E. parviflorum *Schreber.* — E. pubescens *Roth.* — (in pratis paludosis et in fossis, e. c. am Sumpfsee, in den Gräben der Viehweide vor den Röwer-Tannen etc. Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0035
Mecklenburg Vorpommern

294. E. montanum *L.* (in silvis: Töpferkuhlenbruch, Primer; Jun. Aug.)

295. E. roseum *Schreber.* (in fossis, ad loca paludosa nemorum: Töpferkuhlenbruch; Jul. Aug.)

296. E. palustre *L.* (in pratis paludosis, ad fossas: am Sumpfsee etc. Jul. Aug.)

145. Vaccinium [*Heidelbeere*].

297. V. Myrtillus *L.* [*Heidelbeere*] (in silvestribus, e. g. Röwer-Tannen, vulgatissimum; Maj. Jun.)

298. V. uliginosum *L.* [*Rauschbeere*] (in locis uliginosis, turfosis: auf der Schöninsel; Maj. Jun.)

146. Oxycoccos [*Moosbeere*].

299. O. palustris *Persoon.* — Schollera Oxycoccos *Roth.* — (in paludibus Sphagno repletis, e. c. in den Röwer-Tannen; Jun.)

147. Calluna [*Besenheide*].

300. C. vulgaris *Salisbury.* (in pascuis arenosis, in turfosis, vulgatissima; Aug. Sept.)

148. Acer [*Ahorn*].

301. A. campestre *L.* [*Feldahorn, Massholder*] (in dumetis et sepibus am Parumschen See; Maj.)

149. Polygonum [*Knöterich*].

302. P. Hydropiper *L.* (in locis humidis, silvis umbrosis abunde, e. g. in den Hasenhören; Jul. — Sept.)

303. P. minus *Aiton.* (Indicavit *John;* ipse non vidi vel praetermisi.)

304. P. Persicaria *L.* (in locis humidis, agris cultis vulgare; Jul. — Sept.)

305. P. lapathifolium *Aiton.* (in cultis agris cum antecedente frequens; Jul. — Sept.)

306. * P. nodosum *Persoon.* — Reichenb. Fl. exc. nr. 3699. (Semel legi ad fossam in der Mühlen-Vorstadt; Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0036
Mecklenburg Vorpommern

307. P. amphibium *L.* — *α. natans; β. terrestre.* (*α.* in fossis, *β. in agris cultis*, ubique; Jul. — Sept.)

308. P. Bistorta *L.* [*Natterwurz*] (auf der St. Jürgens-Wiese; Jun.)

309. P. aviculare *L.* (ad vias, in ruderatis, plateis, ad agrorum margines ubique; Jun. — Oct.)

310. P. Convolvulus *L.* (in agris, hortis et incultis ubique; Jul. in auct.)

311. P. dumetorum *L.* (ad sepes, in dumetis et ruderatis frequens; Jul. in auct.)

150. Paris [*Einbeere*].

312. P. quadrifolia *L.* — variat foliis ternis et quinis. (in nemoribus umbrosis: Hasenhören, Töpferkuhlenbruch frequens; Maj.)

151. Adoxa [*Bisamkraut*].

313. A. Moschatellina *L.* (in nemorosis umbrosis humidis, ad sepes frequens, e. c. vorn in den Hasenhören; April.)

Classis IX. Enneandria.

152. Butomus [*Wasserviole*].

314. B. umbellatus *L.* (in fossis et aquis stagnantibus ubique; Jul.)

Classis X. Decandria.

153. Monotropa [*Ohnblatt*].

315. M. Hypopithys *L.* (ad radices *fagorum* parasitica: im Primer, auch in dem Belliner Predigerholze; Jul.)

154. Ledum [*Porst*].

316. L. palustre *L.* (in locis humidis turfosis, e. c. in dem kleinen Moor in den Röwer-Tannen; Maj.)

155. Pyrola [*Birnkraut*].

317. P. secunda *L.* (in silvis: Röwer-Tannen, Heidberg etc. copiose; Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0037
Mecklenburg Vorpommern

318. P. rosea *Smith.* — Reichenb. Fl. exc. nr. 2784. (in nemorosis umbrosis: Primer; Jun.)

156. Chimophila [*Wintergrün*].

319. Ch. umbellata *Nuttall.* (in silvis: am Heidberge, in den Röwer-Tannen, non raro; Jul.)

157. Andromeda [*Andromeda*].

320. A. polifolia *L.* (in locis humidis turfosis: in dem kleinen Moor in den Röwer-Tannen; Maj. Jun.)

158. Saxifraga [*Steinbrech*].

321. S. granulata *L.* (in aggeribus graminosis, e. g. auf dem Wall, vulgaris; Maj.)

322. S. Hirculus *L.* (in turfosis auf den Wiesen am Parumschen See raro: *John;* ipse vidi quidem, sed non legi; Aug.)

323. S. Tridactylites *L.* (in agris, e. c. auf dem Bauhöfer Felde, copiose bei Badendiek; April. Maj.)

159. Chrysosplenium [*Milzkraut*].

324. Chr. alternifolium *L.* (in locis humidis, ad fossas, rivulos vulgaris; Apr. Maj.)

160. Scleranthus [*Knauel*].

325. Sc. annuus *L.* (in locis aridis, inter segetes vulgaris; aestate.)

326. Sc. perennis *L.* (in campis et collibus arenosis frequens; aestate.)

161. Dianthus [*Nelke*].

327. D. prolifer *L.* (in apricis: am Wege nach der Gleviner Burg; Jul. Aug.)

328. D. Carthusianorum *L.* (in collibus et campis: in den Röwer-Tannen, vor dem Primer frequens; Jul. Aug.)

329. D. deltoides *L.* (in campis et pascuis siccis ubique, e. c. am Wege nach der Gleviner Burg; Jul.)

330. D. superbus *L.* (in pratis humidis, uliginosis: am

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0038
Mecklenburg Vorpommern

Gutower See, bei der Primer-Burg und am Parumschen See, frequens; Jul. Aug.)

162. Silene [*Silene, Leimkraut*].

331. S. nutans *L.* (in collibus herbidis, silvestribus frequens, e. c. in den Röwer-Tannen; Jun. Jul.)

332. S. inflata *Smith.* (in locis dumetosis: am Wege nach der Bülower und nach der Gleviner Burg, frequens; Jul. Aug.)

163. Stellaria [*Sternkraut*].

333. St. Holostea *L.* (in locis graminosis silvarum copiose: Primer; Jun. Jul.)

334. St. glauca *Withering.* (in pratis humidis, ad paludes, e. c. am Gutower See; Jun. Jul.)

335. St. graminea *L.* (in pratis, vulgaris; Jun. Jul.)

336. St. crassifolia *Ehrhart.* (in pratis humidis turfosis: am Sumpfsee u. am Parumschen See; Jul. Aug.)

337. St. uliginosa *Murray.* — St. aquatica *Pollich.* — (in locis udis vorn im Primer; Jun. Jul.)

338. St. media *Villars.* — Alsine media *L.* — (in cultis, ad vias, fossas ubique; floret fere per totum annum.)

339. St. nemorum *L.* (in nemorosis humidis: Primer; Jun. Jul.)

164. Alsine [*Miere*].

340. A. rubra *Wahlenberg.* — Arenaria rubra *α. campestris L.* — (in arenosis campestribus, e. c. vor den Röwer-Tannen, frequens; aestate.)

341. A. tenuifolia *Wahlenb.* — Sabulina tenuifolia *Reichenb.* — Arenaria tenuifolia *L.* (in agris arenosis bei der Gleviner Burg; Jun. — Aug.)

165. Arenaria [*Sandkraut*].

342. A. serpyllifolia *L.* (in agris et campis arenosis frequentissime; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0039
Mecklenburg Vorpommern

166. Moehringia [*Möhringie*].

343. M. trinervia *Clairville.* — Arenaria trinervia *L.* — (in silvis et dumetis: Röwer-Tannen cet. Maj. Jun.)

167. Sedum [*Sedum*].

344. S. Telephium *L.* [*Fette Henne*] (in marginibus agrorum, ad dumeta frequens: bei Helenenlust, am Wege nach der Gleviner Burg, cet. Jul. Aug.) Invenitur nonnunquam caule fasciato.

345. S. sexangulare *L.* (in collibus siccis et in apricis campestribus: am Heidberge, in und bei den Röwer-Tannen; Jun. Jul.)

346. S. acre *L.* (in declivibus siccis et apricis, in aggeribus cet. ubique; Jun. Jul.)

168. Oxalis [*Sauerklee*].

347. O. Acetosella *L.* (in nemorosis et dumetis humidis vulgaris; April. Maj.)

348. O. stricta *L.* (in hortis, ad sepes: in der Schnoien-Vorstadt und im Jahnschen Garten; Jun. in auct.)

169. Lychnis [*Lichtnelke*].

349. L. Viscaria *L.* [*Pechnelke*] (in graminosis siccis am Wege von Badendiek nach Rosin raro; Jun.)

350. L. diurna *Sipthorp.* — L. dioica α. *L.* — L. silvestris *Hoppe.* (in nemorosis, dumetis, ad fossas cet. copiose, c. c. in den Hasenhören; Maj. Jun.)

351. L. vespertina *Sibth.* — L. dioica β. *L.* — L. arvensis *Schkuhr.* (in cultis et incultis vulgaris; Maj. Jun.)

352. L. Flos cuculi *L.* [*Kuckucksblume*] (in pratis fertilibus copiose; Maj. Jun.)

353. L. Githago *Lamarck* — Agrostemma Githago *L.* — [*Raden*] (inter segetes vulgaris; Jun. Jul.)

170. Cerastium [*Hornkraut*].

354. C. glomeratum *Thuillier.* — C. vulgatum herbar.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0040
Mecklenburg Vorpommern

Linn. — β. *eglandulosum Koch.* Synops. p. 121. (in cultis subhumidis, ad fossas: in der Mühlen-Vorstadt etc. Maj. Jun.)

355. C. triviale *Link.* — β. *glandulosum. Koch.* l. l. p. 122. (in pratis et pascuis, ad vias, frequens; Maj. Jun.)

356. C. semidecandrum *L.* — β. *glandulosum. Koch.* C. glutinosum *Fries.* — *γ. *glaberrimum. Koch.* C. macilentum *Aspegren. Koch.* l. l. p. 121. (in arvis, pascuis, campis, collibus apricis ubique; β. ad fossas; γ. auf der Erdmauer und am Wege bei der Krankenkoppel, frequens; April. Maj.)

357. C. arvense *L.* (in campis, collibus apricis, ad viarum et agrorum margines ubique; Maj.)

171. Malachium [*Weichmeier*].

358. M. aquaticum *Fries.* — Cerast. aquat. *L.* (ad fossas et ripas frequens, c. c. bei der Schanze, in der Mühlen-Vorstadt; Jun. — Aug.)

172. Spergula [*Spark.*]

359. Sp. arvensis *L.* — α. *sativa Koch.* Synops. p. 110. (in agris et campis arenosis, c. c. bei den Röwer-Tannen copiose; Jun. — Aug.)

360. Sp. pentandra *L.* (in arenosis, c. c. auf dem Felde vor der Primer-Burg, copiose; Maj.)

361. Sp. nodosa *L.* (in locis humidis, uliginosis, turfosis frequentissime; Jun. Jul.)

Classis XI. Dodecandria.

173. Lythrum [*Blutkraut*].

362. L. Salicaria *L.* (ad fossas, ripas cet. frequens, c. c. bei der Schanze; Jul. Aug.)

174. Agrimonia [*Odermennig*].

363. A. Eupatorium *L.* (in graminosis, ad dumeta et

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0041
Mecklenburg Vorpommern

ad vias frequens: auf dem Wall, am Wege nach der Gleviner Burg etc. Jun. — Aug.)

175. Reseda [*Wau*].

364. R. Luteola *L.* (ad vias nach dem Bauhofe und nach Gutow hin, frequens; Jul. Aug.)

Classis XII. Icosandria.

176. Prunus [*Pflaume*].

365. P. Padus *L.* [*Traubenkirsche*] (in nemoribus humidis, copiose in den Hasenhören; Maj.)

366. P. spinosa *L.* [*Schlehen, Schwarzdorn*] (ad vias, in locis silvestribus vulgaris; April. Maj.)

177. Sorbus [*Eberesche*].

367. S. aucuparia *L.* [*Gemeine Eberesche, Vogelbeerbaum*] (in silvis frequens: Röwer-Tannen etc. Maj. Jun.)

178. Crataegus [*Weissdorn, Mehlbeere*].

368. C. Oxyacantha *L.* — β. floribus monogynis: Mespilus apiifolia *Medicus.* Rchb. Flor. exc. nr. 4047. C. monogyna *Fingerhuth?* — (in silvis, ad vias, sepes, vulgaris; β. am Wege nach der Bülower Burg et alibi frequens; Maj. Jun.)

179. Pyrus*) [*Birnbaum*].

369. P. communis *L.* — α. *glabra Koch.* (in dumetis am Parumschen See; Maj.)

370. P. Malus *L.* — α. *glabra Koch.* P. acerba *De Candolle.* [*Apfelbaum*] (in silvis passim; Maj.)

180. Spiraea [*Spierstaude*].

371. Sp. Ulmaria *L.* [*Wiesenköniginn*] (in pratis humidis, fossis frequentissime: beim Langendammschen Wege etc. Jun. Jul.)

---

*) Scribendum: Pirus.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0042
Mecklenburg Vorpommern

181. Rosa [*Rose*].

372. R. tomentosa *Smith.* (ad vias, in silvestribus locis frequens: am Wege nach der Bülower Burg etc. Jun.)

373. R. canina *L.* (iisdem locis vulgaris: Bülower Eichen, beim Brunnen etc. Jun.)

374. R. rubiginosa *L.* (iisdem locis: diesseits der Rennbahn, am Wege nach der Gleviner Burg; Jun.)

182. Rubus [*Brombeere*].

375. R. Idaeus *L.* [*Himbeere*] (in silvis vulgatissimus; Maj. Jun.)

376. R. caesius *L.* — α. *umbrosus.* Rchb. Fl. exc. nr. 3930. — a. *nemorosus Meyer.* (Chlor. Hanov. p. 48)? — β. *arvalis. Rchb.* l. l. (α. in nemoribus humidis umbrosis: Hasenhören; β. in agris, agrorum marginibus et dumetis ubique; Jun. — Aug.)

377. R. corylifolius *Smith.* — Meyer l. l. pag. 48. et 49. (in den Röwer-Tannen; Jun. Jul.)

378. R. fruticosus *L.* — var. a. *subconcolor Meyer.* l. l. p. 49. R. nitidus et R. affinis *Weihe.* (in silvis vulgaris, e. g. in den Röwer-Tannen, var. a. in pascuis quoque bei der Gleviner Burg; Jun. Jul.)

379. R. Bellardi *Günther.* — R. glandulosus *Bellard.* Meyer l. l. pag. 50. et 51. (in den Röwer-Tannen am Wege; Jun. Jul.)

380. R. saxatilis *L.* (in nemorosis: Röwer-Tannen und Töpferkuhlenbruch; Jun.)

183. Fragaria [*Erdbeere*].

381. F. elatior *Ehrhart.* (in locis silvestribus montanis: auf dem Heidberge, raro; Jun.)

382. F. vesca *L.* (in silvis, nemoribus copiose; Jun.)

383. F. collina *Ehrhart.* (ad dumeta: am Wege nach der Gleviner Burg, rarior; Jun.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0043
Mecklenburg Vorpommern

184. Potentilla [*Fingerkraut*].

384. P. Anserina *L.* — β. *sericea Koch.* (in pascuis, ad vias, ad ripas arenosas vulgaris; Maj. — Jul.)

385. P. argentea *L.* (in locis apricis, ad vias ubique; Jun. Jul.)

386. P. verna *L.* (in locis apricis siccis vor den Röwer-Tannen; April.)

387. P. opaca *L.* (in declivibus apricis, ad dumeta: am Wege nach der Gleviner Burg; Maj. Jun.)

388. P. reptans *L.* (in locis herbidis, pascuis humidis, ad vias frequens: auf dem Wall, bei der Schanze etc. Jun.)

185. Comarum [*Blutauge*].

389. C. palustre *L.* (in locis paludosis, fossis frequens: an der neuen Promenade etc. Jun. Jul.)

186. Tormentilla [*Tormentille*].

390. T. erecta *L.* (in locis silvestribus, pascuis et pratis: am Heidberge, auf den Wiesen am Gutower See etc. Jun. Jul.)

187. Geum [*Benedictenkraut*].

391. G. urbanum *L.* (in nemorosis umbrosis, dumetis subhumidis frequens: in den Hasenhören etc. Jul. Aug.)

392. G. rivale *L.* (in nemorosis, copiose in den Hasenhören, ubi hoc ipso anno specimen legi monstruose luxurians: floribus proliferis, sepalis in folia mutatis. G. hybridum *Wulffen.* — Floret Maj. Jun.)

Classis XIII. Polyandria.

188 Chelidonium [*Schöllkraut*].

393. Ch. majus *L.* (in ruderatis, locis incultis, ad sepes, vias ubique, aestate.)

189. Papaver [*Mohn*].

394. P. dubium *L.* (inter segetes copiosissime; Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0044
Mecklenburg Vorpommern

395. P. Rhoeas *L.* [*Klatschrose*] (inter segetes vulgatissimum; Jun. Jul.) — Specimen floribus geminis legi hoc ipso anno, qui frequens fuit luxuriantibus plantis.

396. P. Argemone *L.* (in agris inter segetes, in locis arenosis vulgaris; Jun. Jul.)

190. Nymphaea [*Seerose*].

397. N. alba *L.* (in Nebula fluvio, in piscinis et fossis: im und am Schwarzen See etc. Jun. Jul.)

191. Nuphar [*Nixblume*].

398. N. luteum *Smith.* (iisdem locis copiosissime; Jun. Jul.)

192. Tilia [*Linde*].

399. T. europaea *L.* Reichenb. Fl. exc. nr. 5138. T. vulgaris *Hayne.* Ex sententia cl. Kochii forma hybrida. (Frequens in ambulacris et coemeteriis colitur, sponte nascentem non vidi. Floret Jun. Jul.)

193. Helianthemum [*Ciströschen*].

400. H. vulgare *Gärtner.* — *β. hirsutum.* — *γ. glabrum. Koch.* (in pascuis apricis et collibus: bei den Röwer-Tannen, am Schneiderberge; Jul.)

194. Delphinium [*Rittersporn*].

401. D. Consolida *L.* (inter segetes vulgaris; Jun. Jul.)

195. Anemone [*Anemone*].

a) Pulsatilla [*Küchenschelle*].

402. A. Pulsatilla *L.* — Pulsatilla vulgaris *Miller.* (in campis et collibus apricis, copiosissime zwischen den Gulen-Tannen und dem Primer; April. Maj.)

403. A. pratensis *L.* — Puls. prat. *Miller.* (in arenosis apricis et silvestribus: bei und in den Röwer-Tannen et alibi frequens; April. Maj.)

b) Anemone (*Windblume*).

404. A. nemorosa *L.* (in silvis, nemoribus, pratis silvaticis ubique; April.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0045
Mecklenburg Vorpommern

405. A. ranunculoides *L.* (iisdem locis frequens: in den Hasenhören, beim Brunnen etc. April.)

c) Hepatica [*Leberblume*].

406. A. Hepatica *L.* — Hepatica triloba *De Candolle.* Hep. nobilis *Volckamer.* (in nemoribus et fruticetis: Hasenhören, Töpferkuhlenbruch etc. frequens; Mart. April.)

196. Thalictrum [*Wiesenraute*].

407. Th. minus *L.* — *α. virens. ε. dumosum Koch.* Synops. p. 4. (in locis editioribus, ad dumeta, inter segetes: am Wege nach der Gleviner und Bülower Burg; Jun. Jul.)

197. Ranunculus [*Ranunkel, Hahnenfuss*].

408. R. aquatilis *L.* — Var. *peltatus, tripartitus* et *pantothrix Koch.* (in fossis aqua stagnante repletis copiosissime; Maj. Jun.)

409. R. divaricatus *Schranck.* — R. circinatus *Sibthorp.* (iisdem locis: im Scheidegraben zwischen der Dom-Wiese und dem Bauhöfer Felde etc. Jun. — Aug.)

410. R. Lingua *L.* (ad ripas et in fossis frequens: bei der Schanze, am Langendammschen Wege etc. Jul. Aug.)

411. R. Flammula *L.* (in pratis humidis, ad ripas et stagna ubique; Jun. — Aug.)

412. R. auricomus *L.* (in nemoribus, locis humidis, pratis silvaticis: bei der Rennbahn, vor dem Primer, frequens; April. Maj.) Flores in nostra regione semper mutilati, petalis aut omnino deficientibus, aut uno tantum exserto.

413. R. sceleratus *L.* (in fossis, paludibus, ad ripas vulgaris; Jun. — in auctumn.)

414. R. acris *L.* (copiosissime ubique in pratis, silvis etc. Maj. — Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0046
Mecklenburg Vorpommern

415. R. polyanthemos *L.* (in silvis frequens: auf und bei dem Turnplatz, in den Röwer-Tannen, auf dem Heidberge; Maj. — Jul.)

416. R. lanuginosus *L.* (in locis silvestribus umbrosis, humidis vulgaris: Hasenhören, beim Brunnen; Maj. — Jul.)

417. R. repens *L.* (in locis humidis graminosis ubique; Maj. — Jul.)

418. R. bulbosus *L.* (in locis graminosis, pascuis, campis, ad silvarum oras ubique, e. c. auf dem Wall; Maj. — Jul.)

419. R. arvensis *L.* (inter segetes, frequens prope Gutow et Badendiek; Maj. — Jul.)

420. R. Ficaria *L.* — Ficaria ranunculoides *Roth.* [*Scharbockskraut*] (in locis humidis ad sepes frequens: Hasenhören etc. April. Maj.)

198. Caltha [*Dotterblume*].

421. C. palustris *L.* (in pratis vulgatissima; April. Maj.)

199. Helleborus [*Nieswurz*].

422. *H. foetidus *L.* (in ruinis dumeto obsitis auf dem Schlossberge der Schöninsel; at dubito, an vere indigena non sit. Mart. April.)

Classis XIV. Didynamia.

200. Ajuga [*Günsel*].

423. A. genevensis *L.* — var. corollis roseis: A. genev. *L.* — et albis. (in pratis siccis, agris arenosis, locis apricis vulgaris; Maj. Jun.)

424. A. reptans *L.* (in silvestribus humidis: Hasenhören cet. frequens; Maj. Jun.)

201. Teucrium [*Gamander*].

425. T. Scordium *L.* (in fossis prope Helenenlust, ad ripas Nebulae copiose; Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0047
Mecklenburg Vorpommern

202. Nepeta [*Katzenmünze*].

426. N. Cataria *L.* (ad vias et sepes: bei der Ziegelei und auf der Schöninsel; Jul. Aug.) Corolla rubropunctata, herba *interdum* citriodora.

203. Mentha [*Münze*].

427. M. silvestris *L.* (bei Jahn's [Boldt's] Garten und auf der Gliener Wiese; Jul. — Sept.)

428. M. aquatica *L.* (ad ripas, in fossis, inundatis ubique; Jul. — Sept.)

429. M. arvensis *L.* (in agris post messem copiose; Jul. — Sept.)

204. Glechoma [*Gundermann, Gundelrebe*].

430. G. hederaceum *L.* (ad sepes, in cultis, pratis cet. ubique; April. Maj.)

205. Lamium [*Bienensaug, Taube-Nessel*].

431. L. album *L.* (in cultis, ad sepes, vias vulgare; April. Maj.)

432. L. purpureum *L.* (in cultis vulgatissimum; April. — Sept.)

433. L. dissectum *Withering.* — L. incisum *Willdenow.* Ex sententia cl. Meyeri (Chlor. Hanov. p. 298.) mera praecedentis varietas vel forma hybrida. (in agris: beim Brunnen; April. Maj.)

434. L. amplexicaule *L.* (in agris, hortis vulgare; floret vere et aestate.)

206. Galeopsis [*Hohlzahn*].

435. G. Ladanum *L.* (in agris arenosis, praecipue post messem, copiosissime prope Badendiek; Aug.)

436. G. versicolor *Curtis.* (in agris subhumidis passim; Jul. Aug.)

437. G. Tetrahit *L.* (in agris, ad sepes, in silvis: Röwer-Tannen etc. copiose; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0048
Mecklenburg Vorpommern

207. Galeobdolon [*Gilbnessel*].

438. G. luteum *Smith.* (in nemoribus frequens: beim Brunnen etc. April. Maj.)

208. Betonica [*Betonie*].

439. B. hirta *Leysser.* (semel lecta ab amico meo *John*: in den Röwer-Tannen; Aug.)

209. Stachys [*Ziest*].

440. St. silvatica *L.* (in nemoribus umbrosis frequens: Hasenhören etc. Jun. — Aug.)

441. St. palustris *L.* (in locis humidis ad ripas et fossas, inter segetes vulgaris; Jun. — Aug.)

442. St. arvensis *L.* (in agris bei den Hasenhören: *John;* floret Jul. Aug.)

210. Ballota [*Ballote*].

443. B. nigra *L.* — B. vulgaris *Link.* (ad vias et sepes vulgaris; Jul. — Sept.)

211. Marrubium [*Andorn*].

444. M. vulgare *L.* (in ruderatis, ad vias passim: in der Mühlen-Vorstadt, am Wege nach dem Bauhofe, bei Gutow; Jul. — Sept.)

212. Leonurus [*Wolfstrapp, Herzgespann*].

445. L. Cardiaca *L.* (in ruderatis, ad vias et sepes: bei der Ziegelei, am Wege nach dem Bauhofe etc. Jul. — Sept.)

213. Clinopodium [*Wirbeldoste, Weichborste*].

446. Cl. vulgare *L.* (in dumetis, fossis graminosis, silvis: am Wege nach der Bülower Burg, am Langendammschen Wege etc. Jul. Aug.)

214. Origanum [*Dosten*]

447. O. vulgare *L.* (am südlichen Abhange der Schöninsel; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0049
Mecklenburg Vorpommern

215. Thymus [*Feld-Quendel*].

448. Th. Serpyllum *L.* — β. *angustifolius.* Th. angustifol. *Schreber.* — var. florib. albis. (in locis siccis, graminosis, arenosis ubique; β. copiose in und bei den Röwer-Tannen; Jun. Jul.)

216. Acinos [*Berg-Quendel*].

449. A. thymoides *Mönch.* — Calamintha Acinos *Clairville.* Thymus Acinos *L.* (in arenosis: am Wege nach der Gleviner Burg etc. Jun. — Aug.)

217. Scutellaria [*Helmkraut*].

450. Sc. galericulata *L.* (in locis humidis umbrosis: beim Brunnen, im Töpferkuhlenbruch; Jul. Aug.)

218. Prunella [*Brunelle*].

451. P. vulgaris *L.* (in pratis, pascuis, vulgaris; Jul. — Sept.)

219. Verbena [*Eisenkraut*].

452. V. officinalis *L.* (in ruderatis, ad vias, muros, in fossis, vulgaris; Jul. Aug.)

220. Rhinanthus [*Hahnenkamm*].

453. Rh. major *Ehrhart.* (in pratis humidis et siccis vulgatissimus; Jun. Jul.)

221. Euphrasia [*Augentrost*].

454. Eu. officinalis *L.* — α. *pratensis Koch.* (in pascuis et pratis ubique; Jul. Aug.)

455. Eu. Odontites *L.* [*Zahntrost*] (in pascuis, pratis, inter segetes vulgaris; an der neuen Promenade etc. Jul. Aug.)

222. Melampyrum [*Wachtelweizen*].

456. M. arvense *L.* (in dumetis: am Wege nach der Bülower Burg und am Langendammschen Wege; Aug.)

457. M. nemorosum *L.* (in nemoribus: Hasenhören etc. Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0050
Mecklenburg Vorpommern

458. M. pratense *L.* (in silvis vulgaris: Röwer-Tannen etc. Jun. Jul.)

223. Lathraea [*Schuppenwurz*].

459. L. Squamaria *L.* (parasitica in Coryli Avellanae radicibus: in locis humidis umbrosis beim Brunnen; April. Maj.)

224. Pedicularis [*Läusekraut*].

460. P. palustris *L.* — var. florib. albis. (in pratis paludosis ubique; Maj. Jun.)

461. P. silvatica *L.* (in pascuis subhumidis: vor den Röwer-Tannen und dem Primer, rarior; Maj.)

225. Linaria [*Leinkraut*].

462. L. minor *De Candolle.* (Indicavit *John*: auf der Schöninsel; Jun.)

463. L. vulgaris *Miller.* (ad vias, in agris frequens: am Wege nach dem Bauhofe etc. Jul. Aug.)

226. Scrophularia [*Braunwurz*].

464. Sc. nodosa *L.* (in locis humidis frequens; Jun. — Aug.)

465. Sc. aquatica *L.* (in fossis copiose: an den Aeckern bei den Hasenhören etc. Jul. Aug.)

Classis XV. Tetradynamia.

227. Neslia [*Neslie*].

466. N. paniculata *Desvaux.* (inter segetes frequens: auf den Aeckern zwischen der Stadt und der Gleviner Burg; Jun. Jul.)

228. Raphanus [*Rettig*].

467. R. Raphanistrum *L.* [*Acker- oder Kriebel-Rettig*] (in agris ubique; Jun. Jul.)

229. Senebiera [*Senebiere*].

468. S. Coronopus *Poiret.* (auf der Kuhtrift bei der Ziegelei; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0051
Mecklenburg Vorpommern

230. Farsetia [*Farsetie*].

469. F. incana *R. Brown.* — Berteroa incana *De Candolle.* (ad vias in und bei Lüssow; Jun. Jul.)

231. Draba [*Hungerblümchen*].

470. D. verna *L.* — β. siliculis subrotundis: D. spathulata *Lang.* Koch Synops. p. 65. (in campis et aggeribus ubique, β. in vallo Hagemeisteri; Mart. Apr.)

232. Armoracia [*Meerrettig*].

471. A. rusticana *Flor. Wett.* (ad rivulos, fossas cet. passim: e. g. an der Pramstrasse etc. Maj. Jun.) Hortorum profuga!

233. Thlaspi [*Täschelkraut*].

472. Th. arvense *L.* (in agris, praecipue subhumidis, copiosissime: auf dem Bauhöfer Felde etc. Maj. — in auctumn.)

234. Capsella [*Hirtentäschel*].

473. C. Bursa pastoris *Mönch.* — α. *integrifolia.* β. *sinuata.* γ. *pinnatifida. Koch.* Synops. p. 74. (in locis cultis et incultis ubique; Mart. — in auctumn.)

235. Teesdalia [*Teesdalie*].

474. T. nudicaulis *Rob. Brown.* — T. Iberis *De Candolle.* (in arenosis vulgaris: zwischen den Röwer-Tannen und der Primer-Burg etc. April. Maj.)

236. Nasturtium [*Brunnenkresse*].

475. N. officinale *Rob. Brown.* (in rivulis et fossis aqua pura repletis vulgaris: e. c. in der Mühlen-Vorstadt; Jun. — Sept.)

476. N. silvestre *Rob. Brown.* (in pascuis humidis, ad vias pratorum: bei Helenenlust und ausserhalb der Hageböcker Vorstadt, rarior; Jun. Jul.)

477. N. palustre *De Candolle.* (in locis humidis frequens: in den Gräben am Langendammschen Wege etc. Jun. — Sept.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0052
Mecklenburg Vorpommern

478. N. amphibium *Rob. Brown.* (ad ripas Nebulae, in fossis: bei der Schanze etc. frequens; Jun. Jul.)

237. Barbarea [*Barbenkraut*].

479. B. vulgaris *Rob. Brown.* (in locis humidis, e. g. beim Pfaffenbruch; Maj. Jun.)

238. Turritis [*Thurmkraut*].

480. T. glabra *L.* (in locis editioribus apricis: am Wege nach der Gleviner Burg etc. Maj. Jun.)

239. Arabis [*Gänsekraut*].

481. A. Thaliana *L.* (in agris otiosis ubique frequens; April. Maj.)

240. Cardamine [*Schaumkraut*].

482. C. amara *L.* (in fossis aqua pura repletis, copiose auf der Weide vor dem Primer; April. Maj.)

483. C. hirsuta *L.* (ad fossas: auf der Stadt-Weide vor den Röwer-Tannen, copiose; April. Maj.)

484. C. silvatica *Link.* (Unum solum specimen legi vorn in den Röwer-Tannen; Maj.)

485. C. pratensis *L.* (in pratis vulgaris; April. Maj.)

241. Sisymbrium [*Rauke*].

486. S. officinale *Scopoli.* (ad vias ubique; Jun. — Aug.)

487. S. Sophia *L.* (ad vias et aggeres e. g. bei der Krankenkoppel, copiosissime; Maj. — Aug.)

488. S. Alliaria *Scopoli.* — Erysimum Alliaria *L.* (ad vias, in dumetis et nemorosis: beim Brunnen, am Wege nach der Bülower und Gleviner Burg, nach dem Bauhofe und bei Gutow; April. Maj.)

242. Erysimum [*Hederich*].

489. E. cheiranthoides *L.* (in agris cultis frequens: vor dem Hageböcker Thor etc. Jun. — in auctumn.)

243. Sinapis [*Senf*].

490. S. nigra *L.* (Hanc in agro nostro non nisi cultam vidi; floret Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0053
Mecklenburg Vorpommern

491. S. arvensis *L.* — β. siliqua retrorsum hispida: S. orientalis *Murray.* Koch. Synops. p. 54. (inter segetes ubique; Jun. Jul.)

492. S. alba *L.* (inter segetes copiose; Jun. Jul.)

Classis XVI. Monadelphia.

244. Erodium [*Reiherschnabel*].

493. E. cicutarium *L'Héritier.* (in agris et campis arenosis ubique; April. — auct.)

245. Geranium [*Storchschnabel*].

494. G. palustre *L.* (in pratis silvaticis, ad pratorum dumeta frequens: Hasenhören etc. Jun. Jul.)

495. G. molle *L.* (in cultis, ad vias et sepes copiose: in vallo Hagemeisteri etc. Jun. Jul.)

496. G. columbinum *L.* (in fossa sicca am Langendammschen Wege, in dumetis am Parumschen See; Jun. Jul.)

497. G. dissectum *L.* (unum solum specimen legi: hinter der Gleviner Burg; Jun.)

498. G. pusillum *L.* (in cultis, ad vias sepes ubique; Jun. Jul.)

499. G. robertianum *L.* (in silvis humidis, umbrosis vulgatissimum; Jun. — in auctumn.)

246. Malva [*Malve, Käspappel*].

500. M. rotundifolia *L.* (ad vias, in ruderatis ubique; Jun. — in auctumn.)

501. M. silvestris *L.* (ad vias, sepes, in agris et ruderatis frequens; Jul. Aug.)

502. M. Alcea *L.* (ad sepes, vias, in collibus apricis: an der Rostocker Landstrasse, auf der Schöninsel, bei Badendiek; Jul. Aug.)

Classis XVII. Diadelphia.

247. Corydalis [*Helmbusch*].

503. C. cava *Schweigger et Körte.* — Fumaria bulbosa

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0054
Mecklenburg Vorpommern

α. *L.* — var. florib. purpurascentibus et albis. (in nemoribus: beim Brunnen und im Primer; Apr. Maj.)

248. Fumaria [*Erdrauch*].

504. F. officinalis *L.* (in cultis copiose; Maj. Jun.)

249. Polygala [*Kreuzblume*].

505. P. vulgaris *L.* (in pascuis siccioribus vulgaris: beim Heidberge etc. Maj. Jun.)

250. Spartium [*Pfriemen*, *Besenginster*].

506. Sp. scoparium *L.* (in arenosis copiosissime: Röwer-Tannen etc. Maj. Jun.)

251. Genista [*Ginster*].

507. G. tinctoria *L.* (in pascuis siccis, locis silvaticis frequens: Röwer-Tannen etc. Jun. Jul.)

508. G. anglica *L.* (iisdem locis frequens; Maj. Jun.)

509. G. germanica *L.* (in silvaticis: auf dem Heidberge und in den Röwer-Tannen frequens! Maj. Jun.)

252. Ononis [*Hauhechel*].

510. O. repens *L.* — O. procurrens *Wallroth.* Koch Synops. p. 158. Reichenb. Fl. exc. nr. 3329. (in arenosis frequentissime, e. g. am Wege nach der Gleviner Burg etc. Jun. — Aug.)

253. Anthyllis [*Wundklee*].

511. A. Vulneraria *L.* (in collibus arenosis graminosis: am Heidberge und beim Weinberge; Jun.)

254. Orobus [*Walderbse*].

512. O. vernus *L.* (in silvis, copiose im Primer; Maj.)

513. O. tuberosus *L.* (in silvis frequens: Röwer-Tannen, Primer; Maj.)

514. O. niger *L.* (copiose im Primer; Jun. Jul.)

255. Lathyrus [*Platterbse*].

515. L. pratensis *L.* (in pratis et ad sepes vulgaris; Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0055
Mecklenburg Vorpommern

516. L. silvestris *L.* (in dumetis montanis, rarior: auf der Scheide zwischen dem Bauhöfer und Gutower Felde, an dem Abhange auf der Südseite des Parumschen Sees; Jul. Aug.)

517. L. palustris *L.* (in pratis paludosis am Gutower See, an der neuen Promenade, non raro! Jul. Aug.)

256. Vicia [*Wicke*].

518. *V. silvatica *L.* (copiose im Primer; Jul.) Speciosa haec Vicia omissa est a Dethardingio, quamquam b. Timmius jam indicaverat in appendice Prodromi p. 283.

519. V. cassubica *L.* (in silvis: am Heidberge und im Primer, raro; Jul.)

520. V. Cracca *L.* (in pratis et dumetis frequens: Ellerbruch-Wiesen etc. Jun. — Aug.)

521. V. sativa *L.* (frequens colitur; sponte nascentem non vidi.)

522. V. angustifolia *Roth.* — *α. segetalis. β. Bobartii. Koch.* Synops. p. 197. (in agris et aggeribus frequens: Wall, Bauhöfer Feld etc. Jun. — Aug.)

523. V. lathyroides *L.* (in locis declivibus tenui gramine tectis: am Wall und am Wege nach der Gleviner Burg; April. Maj.)

524. V. sepium *L.* (in nemoribus copiose: Hasenhören, Primer etc. Maj. Jul.)

257. Ervum [*Linse*].

525. E. hirsutum *L.* (inter segetes frequens: auf dem Bauhöfer Felde etc. Jul.)

526. E. tetraspermum *L.* (in graminosis siccis: in dem kleinen Gehölze beim Brunnen; Jul.)

258. Ornithopus [*Vogelfuss*].

527. O. perpusillus *L.* (in campis et pascuis arenosis frequens: bei den Röwer-Tannen etc. Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0056
Mecklenburg Vorpommern

259. Astragalus [*Traganth*, *Erbsenklee*].

528. A. glycyphyllos *L.* (in silvaticis, ad vias in graminosis et ad dumeta: am Wege nach dem Bauhofe, nach der Bülower Burg etc. Jun. Jul.)

260. Melilotus [*Steinklee*].

529. M. officinalis *L.* (in pratis, ad fossas: am Langendammschen Wege und bei Badendiek; Jul. Aug.)

530. M. vulgaris *Willdenow.* (ad vias: am Wege nach Strenz; Jul. Aug.)

261. Trifolium [*Klee*].

531. T. hybridum *L.* (in pratis humidis: links vom Langendammschen Wege, bei der neuen Promenade etc. frequens; Jul. — Sept.)

532. T. repens *L.* (in pratis, pascuis, cultis ubique; Jun. — in auctumn.)

533. T. pratense *L.* (in pratis, pomariis et pascuis graminosis ubique; Maj. — Sept.)

534. T. medium *L.* (in locis siccis argillosis: an dem Acker der Stadt-Ziegelei bei den Hasenhören et alibi non infrequens; Jun. Jul.)

535. T. alpestre *L.* (in loco editiore solo argilloso am Wege nach der Bülower Burg; Jul. Aug.)

536. T. arvense *L.* (in arvis, campis sterilibus abundanter; Jul. — Sept.)

537. T. fragiferum *L.* (in pratis frequens: Ellerbruch-Wiesen etc. auch auf dem Wall; Jun. — Aug.)

538. T. montanum *L.* (in collibus aridis: am Wege nach Lüssow und bei Kussow, rarior; Jun. Jul.)

539. T. agrarium *L.* (in arvis bei Helenenlust; Jun. Jul.)

540. T. procumbens *L.* — *α. majus.* T. campestre *Schreber.* *β. minus.* T. procumbens *Schreb.* Koch: Synops. p. 175. (in campis, pratis, ad vias agge-

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0057
Mecklenburg Vorpommern

res: auf dem Wall, bei den Lehmgruben auf dem Acker der Stadt-Ziegelei etc. frequens; Jun.)

541. T. filiforme *L.* (in pascuis aridis et aggeribus: auf dem Wall, am Heidberge, vor den Röwer-Tannen etc. frequens; Jun. — Aug.)

262. Lotus [*Hornklee*].

542. L. corniculatus *L.* (in pascuis, pratis, ad vias ubique; aestate.)

543. L. major *Scopoli* — L. uliginosus *Schkuhr.* Koch: Synops. p. 178. (in fossis et pratis paludosis: in den Röwer-Tannen etc. Jul. Aug.)

263. Medicago [*Schneckenklee*].

544. M. falcata *L.* [*Sichelklee*] (ad vias: nach der Gleviner Burg und dem Bauhofe hin, zwischen diesem und Gutow copiose; Jul. Aug.)

545. M. lupulina *L.* — β. *Willdenowiana*, leguminibus glanduloso-pilosis, pilis patentibus articulatis. *Koch:* Synops. p. 161. (in pratis, locis graminosis et cultis ubique, e. g. auf dem Wall; aestate.)

546. M. minima *L.* (in apricis siccis graminosis: am Wege nach der Gleviner Burg; Jun.)

Classis XVIII. Polyadelphia.

264. Hypericum [*Hartheu, Johanniskraut*].

547. H. quadrangulum *L.* Rchb. Fl. exc. nr. 5178. Meyer: Chloris Hanov. p. 88. H. quadrangulare *L.* Koch: Synops. p. 134. (in silvis: Röwer-Tannen etc. Jul. Aug.)

548. H. tetrapterum *Fries.* (in pratis udis, ad fossas, ripas ubique, e. g. auf der Mühlen-Wiese, auf den Wiesen am Sumpfsee etc. Jul. Aug.)

549. H. perforatum *L.* (in dumetis, pratis siccis, collibus cet. ubique; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0058
Mecklenburg Vorpommern

550. H. humifusum *L.* (in agris, ericetis et pascuis frequens, e. g. bei der Rennbahn; Jul. — Sept.)

551. H. montanum *L.* (in nemoribus: Primer, Töpferkuhlenbruch; Jul. Aug.)

Classis XIX. Syngenesia.

265. Tragopogon [*Bocksbart*].

552. Tr. pratensis *L.* (in pratis, ad vias, in aggeribus graminosis: in vallo Hagemeisteri, vor dem Gleviner Thor etc. frequens; Jun. Jul.)

266. Scorzonera [*Haferwurzel*].

553. Sc. plantaginea *Schleicher.* Rchb. Fl. exc. nr. 1835. — Sc. humilis *L.* — forma primaria! Meyer: Chloris Hanov. p. 433. (rarissima florae Gustrov. planta; unum solum specimen legi: vorn in den Röwer-Tannen; Jun.)

267. Sonchus [*Gänsedistel*].

554. S. arvensis *L.* (in agris inter segetes, ad fossas frequens: auf dem Bauhöfer Felde, an den Langen Stegen etc. Jun. — Sept.)

555. S. oleraceus *L.* (in cultis, ad vias frequens; Jun. — Sept.)

556. S. asper *Willdenow.* (in cultis, frequens in hortis zu Badendiek; Jul. — Sept.)

268. Lactuca [*Lattig*].

557. L. Scariola *L.* (am Langendammschen Wege raro; Aug.)

269. Prenanthes [*Mauerlattig*].

558. Pr. muralis *L.* — Mycelis muralis *Rchb.* Lactuca muralis *Meyer.* (in nemoribus umbrosis copiose: Primer etc. Jul. Aug.)

270. Taraxacum [*Butterblume*].

559. T. officinale *Mönch.* — Leontodon Taraxacum

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0059
Mecklenburg Vorpommern

L. (in graminosis, planta vulgatissima; April. — Sept.)

560. T. palustre *De Candolle.* (in pratis paludosis: am Gutower und Sumpfsee, etiam in locis siccis graminosis: auf dem Heidberge; Maj.) Vix bona species!

271. Leontodon [*Löwenzahn*].

561. L. auctumnalis *L.* (in pascuis, pratis, silvis, ad vias et agrorum margines ubique; Jul. — Sept.)

562. L. hispidus *L.* (iisdem locis: bei der Schanze, am Wege nach der Bülower Burg etc. frequens; Jun. Jul.)

272. Hieracium [*Habichtskraut*].

563. H. Pilosella *L.* (gregatim in apricis siccis, arenosis ubique; Maj. — Aug.)

564. H. Auricula *L.* — H. Lactucella *Wallroth.* (bei der Rennbahn, raro; Jun.)

565. H. obscurum *Reichenbach.* — secundum Meyerum (Chloris Hanov. p. 47.) non differt ab H. praealto *Villars.* (in loco editiore graminoso am Wege nach der Bülower Burg, raro; Jun.)

566. H. paludosum *L.* (in nemorosis humidis: Hasenhören, Töpferkuhlenbruch etc. non raro; Jun. Jul.)

567. H. murorum *L.* (im Primer; Jun. — Aug.)

568. H. Lachenalii *Gmelin.* Rchb. Fl. exc. nr. 1771. et apud Moesl. p. 1457. — H. murorum *L.* b. *silvaticum Meyer* (Chlor. Hanov. p. 419.), qui plurimas species ab aliis propositas sub hoc nomine conjungit. — Legi quoque specimen foliis lanceolatis, infimo remote denticulato: H. angustifolium *Gmelin*? (in silvis frequens: Heidberg, Hasenhören etc. Jun. Jul.)

569. H. silvestre *Tausch.* Rchb. Fl. exc. nr. 1776. — H. sabaudum *L.* — forma primaria! Meyer l. l.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0060
Mecklenburg Vorpommern

p. 422. (in nemoribus frequens: Primer, Hasenhören, bei den Todten-Tannen; Aug. Sept.)

570. H. umbellatum *L.* (in silvis frequens: Röwer-Tannen etc. Aug. Sept.)

273. Crepis [*Pippau*].

571. Cr. tectorum *L.* — β. *segetalis* Roth. *integrifolia Meyer.* (in agris et agrorum marginibus frequens; Jun. — Aug.)

572. Cr. virens *L.* — β. *runcinata Meyer.* Chlor. Hanov. p. 427. Cr. agrestis *Waldstein et Kitaibel.* Rchb. Fl. exc. nr. 1691. (in agris, ad vias: bei Helenenlust, vor Gutow etc. Jul. — Sept.)

573. Cr. biennis *L.* (in pratis et fossis graminosis, e. g. an der Landstrasse nach Rostock; Jun.)

274. Hypochoeris [*Ferkelkraut*].

574. H. glabra *L.* (in agris arenosis frequens: bei der Klus, bei Badendiek etc. Jun. Jul.)

275. Achyrophorus [*Spreukopf*].

575. A. radicatus *Scopoli.* (in pratis, pascuis, agrorum marginibus, silvis: Röwer-Tannen etc. vulgaris; Jun. Jul.)

276. Lapsana [*Rainkohl*].

576. L. communis *L.* (in cultis, ruderatis silvis vulgaris; Jun. — Aug.)

277. Arnoseris [*Lämmersalat*].

577. A. pusilla *Gärtner.* (in agris arenosis frequens: vor der Primer-Burg etc. Jun. — Aug.)

278. Cichorium [*Cichorie*].

578. C. Intybus *L.* (ad vias ubique; Jun. — Aug.)

279. Lappa [*Klette*].

579. L. major *Gärtner.* — var. b. *minor Meyer.* Chlor. Hanov. p. 447. L. minor *De Candolle.* (in nemoribus, incultis, ad vias frequens; Jul. — Sept.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0061
Mecklenburg Vorpommern

580. L. tomentosa *Allioni*. (ad vias etc. frequens; Jul. — Sept.)

280. Carduus [*Distel*].

581. C. arvensis *Sibthorp*. — Serratula arvensis *L.* (in agris ubique copiose; Jul. Aug.)

582. C. nutans *L.* (in arvis copiose: zwischen dem Bauhof und Gutow, bei Badendiek etc. Jul. Aug.)

583. C. crispus *L.* (ad vias, in fossis siccis: am Wege nach dem Bauhofe, am Langendammschen Wege etc. frequens; Jul. — Sept.)

584. C. palustris *L.* (in paludibus et pratis uliginosis, e. g. auf den Ellerbruch-Wiesen; Jul. Aug.)

585. C. lanceolatus *L.* (ad vias, in ruderatis: vor allen Thoren; Jul. Aug.)

586. C. oleraceus *L.* (in pratis udis, ad fossas copiose, e. g. am Langendammschen Wege; Jul. — Sept.)

587. C. acaulis *L.* — β. *caulescens*. (in pascuis, frequens bei der Rennbahn; Jul. Aug.)

281. Onopordon [*Zellen- oder Krebsdistel*].

588. O. Acanthium *L.* (ad vias, in ruderatis, locis incultis frequens: am Wege nach dem Bauhofe etc. Jul. Aug.)

282. Carlina [*Kreuzdistel*].

589. C. vulgaris *L.* (in locis editioribus graminosis frequens: am Wege nach der Bülower Burg und beim Weinberge; Aug. Sept.)

283. Bidens [*Zweizahn*, *Sumpfstern*].

590. B. tripartita *L.* (ad fossas, in paludibus etc. ubique, e. g. vor dem Gleviner Thor; Aug. Sept.)

591. B. cernua *L.* — β. *radians*. — Coreopsis Bidens *L.* (iisdem locis et eodem tempore.)

284. Eupatorium [*Wasserdost*].

592. Eu. cannabinum *L.* (ad ripas, fossas, in paludibus frequens, e. g. an der Nebel; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0062
Mecklenburg Vorpommern

285. Tanacetum [*Rainfarrn*].

593. T. vulgare *L.* (ad vias ubique; Jul. — Sept.)

286. Artemisia [*Beifuss*].

594. A. campestris *L.* (in pascuis arenosis, agrorum limitibus, ad vias ubique; Aug. Sept.)

595. A. vulgaris *L.* (inter frutices, ad dumeta et vias ubique; Jul. — Sept.)

596. A. Absynthium *L.* [*Wermuth*] (ad vias et muros prope Gutow et Badendiek; Jul. — Sept.)

287. Antennaria [*Katzenpfötchen*].

597. A. dioica *Gärtner.* — Gnaphalium dioicum *L.* (in pascuis aridis: vor den Röwer-Tannen; Maj. — Jul.)

288. Gnaphalium [*Ruhrkraut*].

598. Gn. arenarium *L.* (in locis editioribus arenosis frequens: am Wege nach der Gleviner Burg etc. Jul. — Oct.)

599. Gn. silvaticum *L.* (in nemorosis et silvaticis frequens: Primer, Heidberg, beim Brunnen; Jul. Aug.)

600. Gn. uliginosum *L.* (ad ripas, in pascuis hieme inundatis, in agris humidis arenosis copiose: bei der Rennbahn etc. Jul. Aug.)

289. Filago [*Filzkraut*].

601. F. germanica *L.* (in agris copiose: auf dem Bauhöfer Felde etc. Jul. Aug.)

602. F. montana *L.* — Gnaphalium arvense *Willdenow.* (in agris arenosis: beim Bauhofe etc. Jul. Aug.)

603. F. arvensis *L.* — Gnaphalium montanum *Willdenow.* (in agris arenosis copiosissime: hinter den Röwer-Tannen etc. Jul. Aug.)

290. Erigeron [*Berufungskraut*].

604. E. canadenses *L.* (in pascuis arenosis, agrorum marginibus, ad vias frequens: bei der Rennbahn, den Hasenhören, der Ziegelei etc. Aug. Sept.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0063
Mecklenburg Vorpommern

605. E. acris *L.* (in locis editioribus apricis, in agrorum marginibus, ad vias ubique; Jun. Jul.)

291. Tussilago [*Huflattig*].

606. T. Farfara *L.* (in locis humidis solo argillaceo, in agris, ad fossas, copiose bei den Lehmgruben am Wege nach der Bülower Burg; Mart. — Maj.)

292. Petasites [*Pestwurz*].

607. P. vulgaris *Desfontaines.* — Tussilago Petasites *L.* (ad fossas, in pratis udis copiose: ausserhalb der Schnoien- und Gleviner Vorstadt, bei Badendiek; Mart. April.)

293. Senecio [*Kreuzkraut*].

608. S. vulgaris *L.* (in hortis, agris, ruderatis ubique; floret fere per totum annum.)

609. S. viscosus *L.* (in nemoribus et ruderatis; Jul. Aug.) *John.*

610. S. silvaticus *L.* (in locis arenosis silvarum copiose: Heidberg etc. Jun. — Aug.)

611. S. Jacobaea *L.* (frequens ad vias: am Langendammschen Wege etc. Jul. — Sept.)

294. Solidago [*Goldruthe*].

612. S. Virgaurea *L.* (in silvis: Röwer-Tannen etc. Aug. Sept.)

295. Cineraria [*Aschenkraut*].

613. C. palustris *L.* (in paludosis frequens e. g. beim Sumpfsee, auf der Mühlen-Wiese etc. Jnn. Jul.)

296. Inula [*Alant*].

614. I. britannica *L.* (in prato et ad ripam Nebulae in der Nähe der Parumschen Scheide; Jul. Aug).

297. Pulicaria [*Flöhkraut*].

615. P. dysenterica *Gärtner.* — Inula dysenterica *L.* (ad fossas: ausserhalb der Mühlen-Vorstadt, vor den Röwer-Tannen, in Badendiek; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0064
Mecklenburg Vorpommern

616. P. vulgaris *Gärtner.* — Inula Pulicaria *L.* (ad vias: in Badendiek; bei der Krankenkoppel vor dem Mühlen-Thor, sed hoc loco exstirpata est; Jul. Aug.)

298. Arnica [*Wohlverleih*].

617. A. montana *L.* (in pascuis bei den Röwer-Tannen frequens; Jun. — Aug.)

299. Bellis [*Maslieb, Marienblümchen*].

618. B. perennis *L.* (in locis humili gramine tectis ubique; Mart. — in auctumn.)

300. Chrysanthemum [*Wucherblume*].

619. Chr. Leucanthemum *L.* (ad vias, in pascuis, nemoribus, e. g. beim Brunnen; Jun. — Aug.)

620. Chr. segetum *L.* (in agris haud frequens; Jul. — Sept.)

301. Pyrethrum [*Bertramwurzel*].

621. P. Parthenium *Smith.* (in ruderatis vor dem Gleviner Thor, vix indigena! Jun. — Aug.)

622. P. inodorum *Smith.* (inter segetes frequens; Jul. Aug.)

302. Matricaria [*Kamille*].

623. M. Chamomilla *L.* (in agris, copiose prope Braunsberg, in ruderatis: vor dem Gleviner Thor; Jun. — Aug.)

303. Anthemis [*Hundskamille*].

624. A. arvensis *L.* (in agris et arvis frequens, e. g. auf dem Bauhöfer Felde; Jun. — Aug.)

625. A. Cotula *L.* (in locis incultis, ad vias: Bauhof, Badendiek, copiose; Jul. — Sept.)

626. A. tinctoria *L.* (in apricis, ad dumeta: am Wege nach der Bülower und Gleviner Burg, am Langendammschen Wege, frequens; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0065
Mecklenburg Vorpommern

304. Achillea [*Schafgarbe*].

627. A. Ptarmica *L.* (ad ripam Nebulae in der Nähe des Töpferhauses, rarior; Jul. — Sept.)

628. A. Millefolium *L.* — var. floribus albis et roseis. (in graminosis, ad vias etc. vulgaris; Jun. — Oct.)

305. Centaurea [*Flockenblume*].

629. C. Cyanus *L.* (inter segetes ubique copiose; Jun. — Aug.) Occurrit caule floribusque fasciatis.

630. C. paniculata *L.* (in pascuis aridis, agrorum marginibus: an der Landstrasse nach Rostock und am Möschenberg, frequens; Jul. — Sept.)

631. C. Scabiosa *L.* (ad vias, in agrorum marginibus vulgaris: am Wege nach der Gleviner Burg etc. Jul. — Sept.)

632. C. Jacea *L.* (in pratis et pascuis copiose: auf den Bauhöfer Wiesen, bei der Rennbahn etc. Jun — Sept.)

633. *C. solstitialis *L.* (Semel legi in loco editiore aprico auf der Schanze; Aug. Sept.) Num indigena sit, adhuc dubito, quamquam non semper eodem loco inveniri monet Reichenbachius apud Moesler. p. 1611.)

306. Echinops [*Kugeldistel*].

634. E. sphaerocephalus *L.* (in ruinis auf dem Schlossberge der Schöninsel; Jul. Aug.) Vix indigena! Cf. nr. 422.)

Classis XX. Gynandria.

307. Orchis [*Knabenkraut*].

635. O. Morio *L.* (in pascuis siccis: bei den Röwer- und Gulen-Tannen, bei Badendiek; Maj. Jun.)

636. O. latifolia *L.* — var. foliis maculatis et floribus vel incarnatis vel albis. — β. *angustifolia Meyer.* O. lanceolata *Dietrich.* (Flor. d. Königr. Preussen.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0066
Mecklenburg Vorpommern

Bd. I. Heft 1. nr. 5.) (in pratis udis paludosis ubique; Maj. Jun.)

637. O. maculata *L.* (in nemorosis humidis: vorn im Töpferkuhlenbruch; Jun.)

308. Gymnadenia [*Schnakenblume*].

638. G. conopsea *R. Brown.* (in pratis am Sumpfsee und bei Badendiek; Jun.)

639. G. bifolia *Meyer.* — Habenaria bifolia *R. Brown.* Orchis bifolia *L.* (im Primer frequens; Jun.)

309. Goodyera [*Faunblume*].

640. G. repens *R. Brown.* (in den Röwer-Tannen; Jul. Aug.)

310. Listera [*Zweiblatt*].

641. L. ovata *R. Brown.* (im Töpferkuhlenbruch; Maj. Jun.)

311. Neottia [*Nestwurzel*].

642. N. Nidus avis *Richard.* (in nemoribus: Hasenhören, Töpferkuhlenbruch; Jun.)

312. Epipactis [*Zimbel*].

643. E. latifolia *Swartz.* (in den Todten-Tannen; Aug.)

644. E. palustris *Swartz.* (in pratis paludosis: am Gutower und Parumschen See etc. frequens; Jul. Aug.)

313. Cephalanthera [*Schwert-Zimbel*].

645. C. rubra *Richard.* — Serapias rubra *L.* (im Primer raro; Jun. Jul.)

314. Liparis [*Grünling*].

646. L. Loeselii *Richard.* (in turfosis: auf den Sumpfwiesen am Parumschen See, infrequens; Jul.)

315. Aristolochia [*Osterluzei*].

647. A. Clematitis *L.* (ad sepes in Geist's [olim Witt's] Garten; Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0067
Mecklenburg Vorpommern

Classis XXI. Monoecia.

316. Euphorbia [*Wolfsmilch*].

648. Eu. Peplus *L.* (in hortis et agris vulgaris; Jul. — Sept.)

649. Eu. helioscopia *L.* (iisdem locis frequens; Jul. — Sept.)

317. Zanichellia [*Zanichellie*].

650. Z. palustris *L.* (im Sumpfsee; Jul. Aug.)

318. Callitriche [*Wasserstern*].

651. C. verna *L.* (in fossis copiose, e. g. am Wege nach der Gleviner Burg zur Linken etc. Apr. Maj.)

319. Typha [*Rohrkolbe*].

652. T. latifolia *L.* (in paludibus e. g. auf den Bauhöfer Torfwiesen, beim Schwarzen See etc. Jun. Jul.)

320. Sparganium [*Igelkolbe*].

653. Sp. erectum *L.* — Sp. ramosum *Hudson.* (ad ripas Nebulae et in fossis frequens; Jul. Aug.)

654. Sp. simplex *Hudson.* — Sp. erectum β. *L.* (iisdem locis frequens; Jul. Aug.)

655. Sp. natans *L.* (in fossis, paludibus: in dem Scheidegraben zwischen der Dom-Wiese und dem Bauhöfer Felde, am Sumpfsee, auf der Schöninsel; Jul. Aug.)

321. Carex [*Segge*].

656. C. dioica *L.* (in pratis paludosis: am Gutower und Sumpfsee frequens; Maj.)

657. C. arenaria *L.* (in arenosis bei den Röwer-Tannen, rarior; Maj. Jun.)

658. C. intermedia *Goodenow.* (in pratis udis, ad fossas, e. g. an der neuen Promenade etc. frequens; Maj. Jun.)

659. C. vulpina *L.* (ad fossas et in paludibus frequens, e. g. bei und in den Hasenhören; Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0068
Mecklenburg Vorpommern

660. C. muricata *L.* (in locis graminosis frequens: auf dem Wall, am Wege nach der Gleviner Burg etc. Maj. Jun.)
661. C. teretiuscula *Goodenow.* (*John;* ipse non vidi.)
662. C. paradoxa *Willdenow.* (in paludosis, ad fossas: in den Wiesen am Gutower See, rechts von der Gleviner Burg; April. Maj.)
663. C. leporina *L.* (in pascuis frequens: vor den Röwer-Tannen, am Wege nach der Gleviner Burg; Maj. Jun.)
664. C. stellulata *Goodenow.* (in pratis: vid. nr. 662. Maj. Jun.)
665. C. canescens *L.* (in pratis et ad fossas, e. g. am Ende der Röwer-Tannen nach der Primer-Burg hin; Maj. Jun.)
666. C. elongata *L.* (in pratis paludosis zwischen dem Primer und der Nebel; Maj. Jun.)
667. C. remota *L.* (im Primer; Maj. Jun.)
668. C. cespitosa *L.* (in pratis paludosis, turfosis copiose; Maj. Jun.)
669. C. acuta *L.* (in pratis paludosis, ad fossas vulgaris; Maj. Jun.)
670. C. stricta *Goodenow.* (in paludosis turfosis im Primer; Maj.)
671. C. pilulifera *L.* (in locis arenosis, subhumidis, in nemoribus: im Primer, bei den Röwer-Tannen, am Heidberge; Maj. Jun.)
672. C. ericetorum *Pollich.* — C. ciliata *Willdenow.* (vor den Röwer-Tannen; April. Maj.) *John;* sed mihi non constat.
673. C. praecox *Jacquin.* (in apricis vor den Röwer-Tannen frequens; April. Maj.)
674. C. flava L. — Var. a. Oederi *Meyer.* C. Oederi *Ehrhart.* Meyer. Chlor. Hanov. p. 586. (in pratis

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0069
Mecklenburg Vorpommern

paludosis frequens: am Sumpfsee rechts von der Gleviner Burg, am Parumschen See; Maj. Jun.)

675. C. digitata *L.* (im Primer frequens; Maj.)

676. C. filiformis *L.* (in turfosis: in dem kleinen Moor der Röwer-Tannen; Maj.)

677. C. limosa *L.* (in pratis paludosis am Gutower und Parumschen See; Jun.)

678. C. pallescens *L.* (im Primer frequens; Maj. Jun.)

679. C. panicea *L.* (in pratis vulgaris, e. g. bei der Schanze; April. Maj.)

680. C. distans *L.* (in locis paludosis am Gutower See; Maj. Jun.)

681. C. Drymeja *Ehrhart.* (in nemorosis: Bülower Eichen, Töpferkuhlenbruch, auch in Jahn's [Boldt's] Garten; Maj. Jun.)

682. C. Pseudo-Cyperus *L.* (in fossis: auf der Westseite des Sumpfsees, bei der Schanze, auf der Schöninsel; Maj. Jun.)

683. C. glauca *Scopoli.* (in pratis paludosis frequens; April. — Jun.)

684. C. hirta *L.* — β. *sublaevis Hornemann.* (in pascuis arenosis graminosis frequens, e. g. bei der Rennbahn, am Wege nach der Gleviner Burg etc. β. am Rande des Gutower Sees; Maj. Jun.)

685. C. paludosa *Goodenow.* (in fossis, ad rivulos frequens, e. g. bei der Pramstrasse; April. Maj.)

686. C. riparia *Curtis* (iisdem locis, e. g. ausserhalb der Gleviner Vorstadt, an den Sumpfwiesen beim Parumschen See; April. Maj.)

687. C. ampullacea *Goodenow.* (in paludibus, e. g. im Primer, in dem kleinen Moor der Röwer-Tannen; Maj. Jun.)

688. C. vesicaria *L.* (in paludibus, ad fossas, e. g. auf der Trift bei den Röwer-Tannen; Maj. Jun.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0070
Mecklenburg Vorpommern

322. Almus [*Erle, Eller*].

689. A. glutinosa *Gärtner.* (in paludosis, ad ripas vulgaris; Mart. April.)

323. Urtica [*Nessel*].

690. U. urens *L.* (in cultis, ruderatis, ad muros ubique; Jun. — in auctumn.)

691. U. dioica *L.* (in nemoribus, ruderatis, ad vias ubique; Jun. — in auctumn.)

324. Xanthium [*Spitzklette*].

692. X. Strumarium *L.* (ad vias: in der Schnoien-Vorstadt; Jul. — Sept.

325. Amaranthus [*Amaranth*].

693. A. adscendens *Loiseleur.* Rchb. Fl. exc. nr. 3790. (in ruderatis: vor dem Gleviner Thor; Aug. Sept. — vix indigena!)

326. Ceratophyllum [*Wasserzinken*].

694. C. demersum *L.* (in Nebula fluvio copiose; Jul. Aug.)

327. Myriophyllum [*Fiederblatt*].

695. M. spicatum *L.* (in lacubus et fossis frequens: im Parumschen See, auf den Wiesen und Weiden längs der Nebel etc. Jul. Aug.)

696. M. verticillatum *L.* — *α. pinnatifidum; β. intermedium; γ. pectinatum Koch.* (iisdem locis frequens, e. g. bei den Bülower Eichen, an dem Schwarzen See etc. Jul. Aug.)

328. Sagittaria [*Pfeilblatt*].

697. S. sagittifolia *L.* (in Nebula fluvio et in fossis, e. g. bei der neuen Promenade frequens; Jul. Aug.)

329. Poterium [*Becherknopf*].

698. P. Sanguisorba *L.* (in colle aprico sterili bei dem Weinberge; Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0071
Mecklenburg Vorpommern

330. Quercus [*Eiche*].

699. Q. Robur *L.* (in nemoribus; Maj.)

700. Q. pedunculata *Ehrhart.* (in nemoribus; Maj.)

331. Fagus [*Buche*].

701. F. silvatica *L.* (Floret Maj.)

332. Betula [*Birke*].

702. B. alba *L.* — var. *pendula Ehrhart.* (in nemoribus; Maj.)

703. B. pubescens *Ehrhart.* — β. *glabrata Wahlenberg.* B. carpatica *Willdenow.* Meyer. Chlor. Hanov. p. 502. (in uliginosis turfosis, e. g. in den Röwer-Tannen; Maj.)

333. Carpinus [*Hainbuche*].

704. C. Betulus *L.* (in nemoribus, frequens in den Hasenhören und dem Töpferkuhlenbruch; Maj.)

334. Corylus [*Haselstrauch*].

705. C. Avellana *L.* (in nemorosis, ad silvarum oras, in dumetis frequens; Mart.)

335. Calla [*Korallenkolben*].

706. C. palustris *L.* (in palustribus ad ripas Nebulae etc. Jun. Jul.)

336. Pinus [*Tanne*].

707. P. Abies *L.* — P. Picea *Du Roi.* [*Fichte*] (frequens colitur in silvis: Primer; Maj.)

708. P. silvestris *L.* [*Kiefer*] (Floret Maj. Jun.)

337. Bryonia [*Zaunrübe*].

709. Br. alba *L.* (in sepibus et dumetis passim, e. g. bei der Wassermühle vor dem Gleviner Thor; Maj. Jun.)

Classis XXII. Dioecia.

338. Najas [*Najade*].

710. N. marina *L.* — N. monosperma et N. tetrasperma *Willdenow.* (im Sumpfsee; Jul. Aug.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0072
Mecklenburg Vorpommern

339. Salix [*Weide*].

711. S. triandra *L.* — β. *glaucophylla Meyer.* S. amygdalina *L.* (ad ripas, in fossis et pratis, e. g. in den Lehmgruben auf dem Stadtziegelei-Acker und in der Nähe des Schwarzen Sees; Maj.)

712. S. pentandra *L.* (in pratis paludosis am Gutower See passim, colitur frequens prope Badendiek; Maj.)

713. S. fragilis *L.* (am Rande der Röwer-Tannen, et alibi passim occurrit plantata: beim Rundholze etc. Maj.)

714. S. alba *L.* (frequens colitur ad vias, sponte nascentem non vidi; Maj.)

715. S. viminalis *L.* (Non nisi cultam vidi, ad fossas bei der Schanze, bei Badendiek etc. Maj.)

716. S. repens *L.* (in pratis paludosis, turfosis: bei dem Schwarzen See etc. Maj.)

717. S. rosmarinifolia *L.* (in turfosis: bei dem Schwarzen See; Maj.)

718. S. ambigua *Ehrhart.* (in der Nähe des Schwarzen Sees; Maj.)

719. S. aurita *L.* (in pratis et paludibus frequens, e. g. bei der Primer-Burg; April.)

720. S. cinerea *L.* — S. acuminata *Hoffmann.* — β. *latifolia Meyer.* Chlor. Hanov. p. 492. S. aquatica *Smith.* (in pratis humidis et paludibus frequens: unten am Heidberge etc. April.)

721. S. Capraea *L.* (in silvis ubique; April.)

340. Viscum [*Mistel*].

722. V. album *L.* (in ramis Mali parasiticum: im Predigergarten zu Badendiek, auf der Schöninsel; sed utroque loco nunc exstirpatum est. Mart. April.)

341. Cannabis [*Hanf*].

723. C. sativa *L.* (oriunda ex Persia, sponte propagata

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0073
Mecklenburg Vorpommern

haud infrequens occurrit ad vias, e. g. bei der Ziegelei in der Gleviner Vorstadt etc. Jun. — Aug.)

342. Humulus [*Hopfen*].

724. H. Lupulus *L.* (in dumetis et sepibus frequens, e. g. in den Hasenhören; Jul. Aug.)

343. Populus [*Pappel*].

725. P. alba *L.* (bei der neuen Promenade, sed vix sponte.)
726. P. tremula *L.* [*Aespe*] (ad silvarum oras frequens: Röwer-Tannen, Hasenhören etc. April.) Turionum folia exacte cordata.
727. P. nigra *L.* (auf der Schöninsel; April.)

344. Mercurialis [*Bingelkraut*].

728. M. perennis *L.* (in locis humidis inter dumeta prope Badendiek; April.)
729. M. annua *L.* (Hanc in hortis suburbanis nasci audivi quidem, sed nondum vidi.)

345. Hydrocharis [*Froschbiss*].

730. H. Morsus ranae *L.* (in fossis copiose, e. g. an der neuen Promenade; Jul. Aug.)

346. Stratiotes [*Siggel, Sumpf-Aloe*].

731. St. aloides *L.* (in fossis copiose, e. g. in dem Scheidegraben zwischen der Dom-Wiese und dem Bauhöfer Felde etc. Jul. Aug.)

347. Juniperus [*Wachholder*].

732. J. communis *L.* (in silvis copiosissime: Röwer-Tannen etc. Maj.)

Omissum et suo loco inserendum:

118. b G. boreale *L.* (Legi quidem ad Gustroviam, sed quo loco, nunc dicere non possum.)

Corrigenda.

p. 1. pro: Rheinweide leg. Rainweide.
Pro: Helenenlust ubique leg. Magdalenenlust.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0074
Mecklenburg Vorpommern

Schul-Chronik.

1. Lehrercollegium.

Nachdem der bisherige Schreib- und Rechenmeister Herr Oelschläger, welcher seit 4 Jahren mit vorzüglichem Erfolge in hiesiger Schule unterrichtete, zu Ostern d. J. seinen Abschied genommen hatte, um anderweitigen Aussichten zu folgen; so wurden die Geschäfte desselben interimistisch und bis auf weitere Verfügung dem bisherigen Privatlehrer Herrn van Rumpt übertragen, der sich mit Eifer und Erfolg denselben bis hieher unterzogen hat. Es bestehet demnach das gesammte Collegium aus:

dem Rector Prof. Dr. Besser,
dem Conrector ad interim, Domprediger Dr. Vermehren, mit wöchentlichen 12 Stunden,
dem Prorector Wendhausen,
dem Quartus Francke, welcher jedoch in seiner Abwesenheit durch den Cand. Müller interimistisch vertreten wird,
dem Quintus Krückmann,
dem Sextus Prahl,
dem Collaborator Dr. Raspe, welcher zugleich die Geschäfte des Cantorats verwaltet,
dem Collaborator Matthäi,
dem Schreib- und Rechenmeister ad interim van Rumpt.

2. Frequenz der Schule.

Im Anfange des Wintersemesters 1837 saßen: in Prima 20 Schüler, unter welchen 14 Auswärtige; in Secunda 17, A. 6; in Tertia 23, A. 3; in Quarta 42, A. 6; in

Quinta 29, A. 2; in Sexta 20, A. 4; in der Realclasse, (im Range nächst Tertia) 46, A. 4. — Summa 197, unter denen 39 auswärtige Schüler.

Im Sommersemester 1837 waren: in Prima 18, A. 10; in Secunda 16, A. 6; in Tertia 21, A. 5; in Quarta 33, A. 4; in Quinta 31, A. 3; in Sexta 19, A. 2; in der ersten Realclasse 32, A. 4; in der zweiten Realclasse 15, A. 3. — Summa 185, A. 37.

3. Abiturienten.

Mit dem Zeugniß der Reife nach überstandener Prüfung gingen zur Akademie:

Ostern d. J.

1) Jo. Fr. Theod. Viereck aus Parchim. (Med.)
2) Ferd. Otto aus Grabow. (Jur.)
3) H. W. Ge. Friederichs aus Lübz. (Jur.)
4) Jul. F. Bernh. Walter aus Serrahn. (Theol.)
5) Detlov F. Fz. Rötger aus Bützow. (Jur.)
6) C. Jul. Piper aus Grabow. (Theol.)

4. Schulfeierlichkeiten.

Am 18. October vorigen Jahres wurde in Folge des Octoberlegats das Leipziger Siegesfest in gewohnter Art gefeiert: 1) durch eine Rede des Hrn. Prahl über den Fürsten Blücher; und 2) des Primaners Voß aus Güstrow, welcher die guten Seiten der deutschen Staatsverfassung hervorzuheben suchte. — Desgleichen, dem v. Ketelhotschen Legat zufolge, das Reformationsfest am 31. October: 1) durch eine Rede des Rectors über einige vorbereitende Ursachen der Reformation; und 2) des Primaners Otto aus Grabow, über Luthers Tod und sein Leichenbegängniß.

Am 13. März d. J. wurde die Gedächtnißfeier des Höchstsel. Großherzogs Friederich Franz Kön. Hoheit, sowie die Feier des Regierungsantritts Sr. Königl. Hoheit des

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0076
Mecklenburg Vorpommern

Großherzogs Paul Friederich vor einer öffentlichen Versammlung durch eine lateinische Rede des Prorectors Wendhausen und einen deutschen Vortrag des Rectors auf eine dem Gegenstande angemessene Art begangen.

Desgleichen haben wir an dem Geburtstage unseres Allergnädigsten Herrn und Allerhöchsten Patrons unserer Domschule am 15. September d. J. durch einen Redeactus, über dessen Einrichtung die gedruckte Einladung das Nähere besagt, zu der allgemeinen und freudigen Theilnahme auch das Unsrige beizutragen nicht unterlassen wollen.

5. Unsere Schulbibliothek

hat auch in diesem Jahre die Liberalität der hohen Regierung in Schwerin zu rühmen, indem uns dieselbe aus der Büchersammlung des bisherigen verehrlichen Steuercollegii, nebst einem eleganten Bücherschranke eine große Anzahl von größeren und kleineren Werken, meist ökonomischen, technologischen, physicalischen und historischen Inhalts, unter welchen sich auch die Encyclopädie von Krünitz B. 1. — 108. befindet, geschenkt hat.

Imgleichen bescheinigen wir mit dem verbindlichsten Danke empfangen zu haben:

vom Herrn Stud. Aarons: 1) Condorcet Gemälde der Fortschritte d. menschl. Geistes, übers. v. Posselt; 2) Paulus Abhdl. üb. d. Gleichheit d. M. a. d. Holl.; 3) Potter System of Practical Mathematics.

— — Canzellist Arndt: Jacobson Technol. Encyclop. 4 Bde 4.

— — Aug. Hagemeister: 1) Davila Gesch. d. bürgl. Kriege in Frankr. 3 Bde.; 2) Mably Anleitg. f. Prinzen, Gesch. zu stud.; 3) Woyda d. Geist d. Rechte d. M.; 4) de la Messiliere Reise nach Petersburg.

— — Cand. Müller: 1) Jahns neue Jahrbb. d. Philol. B. 8. — 12.; 2) Neue Kirchenzeitg. f. d. J. 34.

— — Opitz u. Frege: Das Conventikelwesen v. Prahl.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0077
Mecklenburg Vorpommern

vom Herrn Revisionsrath Schumacher in Schwerin: Hume Hist. de l'Angleterre. 7. Voll. 4.

— — Domainenrath Sibeth: Ein Convol. Mecklenburgensien.

— — Stud. Vermehren: 1) Cavallo Abh. v. Magnet; 2) Delamétherie Théorie de la Terre. 3 Tomes; 3) de Loys Gesch. d. Naturlehre. 2 Bde.; 4) Priestley Gesch. d. Electr.

— — Dr. Volger: Neocorus Chronik d. Ditmarschen. 2 Bde.

Unserem Primaner Aug. Rötger verdanken wir: Histoire générale des Voyages. XV Voll. 4.

6. Lectionsplan für das Wintersemester $18\frac{37}{38}$.

Vorwort. Wir wissen es sehr wohl, daß unser Lectionssystem hin und wieder mangelhaft ist, obgleich durch die Persönlichkeit der Lehrer und ihre Thätigkeit und Pflichttreue diese Mängel größten Theils gedeckt werden. Was übrig bleibt, steht nicht in unserer Gewalt, so lange gewisse Beschränkungen und Hindernisse, deren öffentliche Besprechung ungeziemend sein würde, nicht gehoben sind. Seit mehreren Jahren haben wir einer Reform unserer Schule, welche besonders durch eine Vermehrung der Lehrerzahl, so wie durch eine gänzliche Trennung der Gymnasialclassen von den Classen der Bürgerschule, oder doch wenigstens durch eine schärfere Absonderung beider Lehrkreise bedingt wird, mit Sehnsucht entgegengesehen, und dürfen itzt hoffen, daß durch die Vorsorge des Allerhöchsten Patronats, wie durch den patriotischen Sinn und ein williges Entgegenkommen des höchstverehrlichen Compatronats, vielleicht noch im Laufe dieses Winters dieselbe zu Stande kommen wird. — Die folgende Uebersicht hat übrigens, um das Programm nicht zu sehr auszudehnen, nur kurz gefaßt werden können.

A. Religion, in 4 Classen.

1. Classe. Rector: 2 Stunden nach Niemeyers Lehrbuch. Die Beweisstellen werden im Grundtext nachgeschlagen.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0078
Mecklenburg Vorpommern

2. Classe. Sext. Prahl: 2 Stdd. nach eigenen Dictaten.

3. Classe. Dr. Raspe: 4 Stdd. Eigner Gang. Nächst ihm lehrt in derselben Classe Sext. Prahl Religionsgeschichte in 2 Stdd. Summa 6 Stdd.

4. Classe. Cand. Müller: 4 Stdd. — gebraucht beim Unterricht den Katechismus; auch wird derselbe Coetus in 2 Stdd. vom Collab. Matthäi in der biblischen Geschichte unterrichtet. Summa 6 Stdd.

B. Sprachen.

a. Lateinische Sprache, in 6 Classen nach der Zumptschen Grammatik, und zwar nach der größeren in den 3 obern, nach der kleineren in den beiden folgenden Classen, und nach der kleinen Bröderschen Grammatik in Sexta.

1. Classe. Rector: 8 Stdd., von denen 3 zur Erklärung des Quintilian (Buch 10.), 2 zur Lesung des Horaz, 3 resp. zur Beurtheilung der lat. Ausarbeitungen und Exercitien, so wie zum extemporellen Lateinschreiben und Uebungen im Lateinsprechen, Disputiren und Interpretiren verwandt werden. Zum Behuf der Exercitien wird Webers Uebungsschule gebraucht. — Nächstdem wird in 2 Stdd. der Prorector Wendhausen die Röm. Alterthümer nach Haacke in Verbindung mit dem Sueton erklären. Summa 10 Stdd.

2. Classe. Pror. Wendhausen: 6 Stdd. Statarisch wird gelesen **Cic. pro Milone**, cursorisch **Sallustii Iugurtha** und einige kleinere Cic. Reden. Exercitien werden aus Zumpts Anleitung und außerdem lat. Ausarbeitungen gemacht. Neben ihm erklärt in 2 Stdd. Sext. Prahl die **Ovid. Metamorphosen.** Summa 8 Stdd.

3. Classe. Dr. Raspe in 6 Stdd. erklärt den **Caesar B. G. VI.** statarisch, so wie Zimmermanns Anthologie in Verbindung mit Keims Anl. z. lat. Verslehre. Exercitien werden aus Keims Materialien aufgegeben. In anderen 2 Stdd. liest Cand. Müller **Caesar B. G. III.** und **IV.** cursorisch. Summa 8 Stdd.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0079
Mecklenburg Vorpommern

4. Classe. Sext. Prahl gebraucht in 6 Stdd. Jacobs lat. Elementarb. und August pract. Vorübungen.

5. Classe. Collab. Matthäi desgl. in 6 Stdd. Gedike's lat. Leseb. und August pract. Vorübungen.

6. Classe. van Rumpt: in 4 Stdd. die kleine Bröder'sche Grammatik.

b. Griechische Sprache, in 4 Classen nach Anleitung der Grammatik von Rost.

1. Classe. Dr. Vermehren: 4 Stdd. Platons Phädon. Exercitien aus Blume Anl. z. Uebers. aus dem Lat. ins Gr. Dr. Raspe wird in 2 Stdd. Hom. Il. erklären. Summa 6 Stdd.

2. Classe. Pror. Wendhausen: 6 Stdd. Hom. Od. und Xenophon Anabasis. Zum Uebers. Rost und Wüstemanns Anleitung.

3. Classe. Dr. Raspe: 4 Stdd. Jacobs Leseb. und Heß Uebungsbuch.

4. Classe. Collab. Matthäi: 2 Stdd. Jacobs Lesebuch.

c. Hebräische Sprache, in 2 Classen.

1. Classe. Dr. Vermehren: 2 Stdd. Gesenius Gr. und Leseb. Exercit. a. d. N. T.

2. Classe. Sext. Prahl: 2 Stdd. Gesenius Gr. u. Leseb.

d. Französische Sprache, in 4 Classen nach Anleitung der Kirchhofschen Grammatik.

1. Classe. Pror. Wendhausen: 4 Stdd. Ideler u. Nolte Handbuch.

2. Classe. Quint. Krückmann: 4 Stdd. Voltaire Charles XII.

3. Classe. Dr. Raspe: 4 Stdd. Hirzel Lesebuch und dessen Uebungsb. Curs. 1. für Abth. 3; für Abth. 2 und 1 der deutsche Theil v. Hirzel.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0080
Mecklenburg Vorpommern

4. Classe. Cand. Müller: 4 Stdd. Hirzel Leseb. und dessen Uebungsbuch Curs. 1.

e. Deutsche Sprache, in 7 Classen.

1. Rhetor. Classe. Rector: 2 Stdd. Ausarbeitungen u. Declamationsübungen.

2. Rhet. Classe. Dr. Raspe: 2 Stdd. dasselbe.

3. Rhet. Classe. Cand. Müller: 2 Stdd. dasselbe.

4. Rhet. Classe. Quint. Krückmann: 2 Stdd. dasselbe.

5. Erste Classe der deut. Grammatik. Sext. Prahl: 2 Stdd. Heyse kleine deut. Gr.

6. Zweite Classe d. deut. Gr. Quint. Krückmann: 2 Stdd. dieselbe Sprachlehre,

7. Dritte Classe d. deut. Gr. Cand. Müller: 2 Stdd. dieselbe.

C. Wissenschaften.

a. Mathematik, in 8 Classen.

1. Classe. Dr. Vermehren: 4 Stdd. Fischers Lehrb. u. Meier Hirsch Beispielsammlung.

2. Classe. Pror. Wendhausen: 4 Stdd. Fischer.

3. Classe. Collab. Matthäi: 4 Stdd. Fischer.

4. Erste Rechenclasse. van Rumpt: 4 Stdd. Ohne bestimmten Leitfaden.

5. Zweite Rechenclasse. Sext. Prahl: 2 Stdd. Scholz Aufgaben.

6. Dritte Rechenclasse. Cand. Müller: 2 Stdd. Scholz.

7. Vierte Rechencl. Quint. Krückmann: 4 Stdd. Scholz.

8. Kopfrechnen. Quint. Krückmann: 2 Stdd.

b. Geographie, in 4 Classen, ohne Compendien, aber mit Wandcharten.

1. Classe. Sext. Prahl: 2 Stdd. Math. Geogr. und die der fremden Welttheile.

2. Classe. Quint. Krückmann: 2 Stdd. Europa, besonders Deutschland.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0081
Mecklenburg Vorpommern

3. Classe. Collab. Matthäi: 2 Stdd. Allg. Uebersicht.

4. Classe. Rector: 2 Stdd. Kürzere allg. Uebersicht.

c. Geschichte, in 5 Classen.

1. Classe. Rector: 2 Stdd. Neuere Geschichte seit Christi Geburt und dem Anfang des römischen Principats.

2. Classe. Dr. Vermehren: 2 Stdd. Alte Geschichte in Verbindung mit alter Geogr.

3. Classe. Collab. Matthäi: 2 Stdd. Allg. Geschichte nach Volger.

4. Classe. Sext. Prahl: 2 Stdd. Allg. Geschichte in kürzester Uebersicht nach Bredow.

5. Classe, für alle diejenigen aus den untern Classen bestimmt, die kein Französisch lernen und welche hier mit der Geographie und Geschichte von Mecklenburg beschäftigt werden. (Abwechselnd wird auch bisweilen Diätetik getrieben.) Collab. Matthäi: 4 Stdd.

d. Naturkunde und Technologie, in 5 Classen.

Erste Realclasse, (Hauptclasse für alle die kein Latein lernen und im Range auf Tert. lat. folgend) Quint. Krückmann: 6 Stdd. Poppe's Lehrbuch.

Zweite Realclasse, (im Range mit den unteren lat. Classen [V. und VI.] gleichstehend) Cand. Müller: 6 Stdd.

Classe der popul. Physik. Quint. Krückmann: 2 Stdd. Kries Lehrbuch.

Erste naturhist. Classe. Quint. Krückmann: 2 Stdd.

Zweite naturhist. Classe. Sext. Prahl: 2 Stdd.

D. Fertigkeiten.

a. Schreibkunst, in 2 Classen, jede mit 3 Abtheilungen.

Erste Classe mit sämmtlichen 3 Abtheilungen, v. Rumpt: à 2 Stdd. Summa 6 Stdd.

Zweite Classe Abth. 1 und 2. Cand. Müller: à 2 Stdd. Abth. 3. Sext. Prahl: 2 Stdd. Summa 6 Stdd.

b. Gesang, in 2 Classen.

à 2 Stdd. Summa 4 Stdd. Dr. Raspe.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0082
Mecklenburg Vorpommern

7. Uebersicht des Examens.

Vormittags 10 Uhr.

1) Singschule. 1. Collab.
2) Erste lat. Classe. Rector.
3) Zweite math. Classe. Prorector.
4) Erste histor. Classe. Rector.
5) Zweite lat. Classe. Prorector.

Nachmittags 3 Uhr.

1) Zweite hist. Classe. Dr. Vermehren.
2) Dritte griech. Classe. 1. Collab.
3) Dritte mathem. Classe. 2. Collab.
4) Erste Rechenclasse. van Rumpt.

Zwischen diesen Classen werden als Declamatoren auftreten:

1. Vormittags.

Schröter (III.): Der alte Hans, von Weidmann.
C. Greffrath (III.): Der Herr von Fuchs, von Teubern.
Hm. Radel (III.): Der Sänger, von Göthe.

2. Nachmittags.

Warncke (IV.): Columbus, von L. Brachmann.
Gabillon (IV.): Der großmüthige Ibrahim, von Pfeffel.
Simon Hirsch (IV.): Der Handschuh, von Schiller.

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0083
Mecklenburg Vorpommern



Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0088
Mecklenburg Vorpommern

XXI. Monoecia.

horbia [*Wolfsmilch*].

648. Eu (in hortis et agris vulgaris; Jul.

649. Eu ia *L.* (iisdem locis frequens; Jul.

chellia [*Zanichellie*].

650. Z. (im Sumpfsee; Jul. Aug.)

riche [*Wasserstern*].

651. C. in fossis copiose, e. g. am Wege na r Burg zur Linken etc. Apr. Maj.)

ypha [*Rohrkolbe*].

652. T. (in paludibus e. g. auf den Bau- hö beim Schwarzen See etc. Jun. Jul.)

rganium [*Igelkolbe*].

653. Sp *L.* — Sp. ramosum *Hudson.* (ad rip in fossis frequens; Jul. Aug.)

654. Sp *udson.* — Sp. erectum β. *L.* (iis- de ns; Jul. Aug.)

655. Sp in fossis, paludibus: in dem Schei- de n der Dom-Wiese und dem Bau- hö n Sumpfsee, auf der Schöninsel; Jul

Carex [*Segge*].

656. C. (in pratis paludosis: am Gutower un equens; Maj.)

657. C. (in arenosis bei den Röwer-Tan- ne Jun.)

658. C. *Goodenow.* (in pratis udis, ad fossas, e. g Promenade etc. frequens; Maj. Jun.)

659. C. ad fossas et in paludibus frequens, e. den Hasenhören; Jun. Jul.)

Barlachstadt Güstrow
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1014840058/phys_0089
Mecklenburg Vorpommern