

De Cortice Peruviano Rubro

Buetzovii: Ex Officina Fritziana, [1786]

<http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn88603891X>

Druck Freier  Zugang



Universität Bützow
Med. Fak. 1786
Graumann/Neuendahl

Bützow 040

DE
CORTICE PERUVIANO RUBRO
SUB PRAESIDIO
PETRI BENEDICTI CHRISTIANI
GRAUMANN

MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE DOCTORIS
PROFESSORIS MEDICINAE PUBLICI ORDIN. AC
PHYSICI PROVINCIALIS

ANNUENTE
GRATIOSA FACULTATE MEDICA
PRO GRADU DOCTORIS
MDCCLXXXVI. DIE XIII. OCTOBRIS

HORA IX. MATUTINA

PUBLICE
IN AUDITORIO MAIORI
DISPUTABIT
AUCTOR

CHRISTIANUS PETRUS GOTTLIEB DE NEUENDAHL
BOIZENBURGENSIS.

BUETZOVII
EX OFFICINA FRITZIANA.

THESES.

I.

Cortex peruvianus ruber ad adstringentia potius remedia referendus, quam ad roborantia.

II.

Cortex peruvianus ruber majori circumspetione propinatio debet, quam vulgaris.

III.

Infusum frigidum corticis peruviani vulgaris debile & fere inutilis, illud vero corticis rubri efficax est remedium.

IV.

Cortex peruvianus ruber non esse videtur cortex trunci arboris Cinchonæ officinalis L., sed ex alia specie, forsitan ex alio genere vegetabilium colligitur.

V.

Cortex peruvianus ruber magis puredini resistit, quam vulgaris.

VI.

Cortex peruvianus ruber febriles motus fistit, quos vulgaris supprimere non valet.

VII.

Cortex peruvianus ruber novum est remedium, nec antea cognitum.

VIII.

Caveat Medicus, ne corticem peruvianum exhibeat, si obstruções Viscerum iam præsentes sunt, aut si illæ timenda.

IX.

IX.

Præparata spirituosa e cortice peruviano rubro virtutibus pa-
rum distant, a præparatis spirituosis e cortice peruviano vulgari.

X.

Sectio Ossium pubis in partu difficiili nullum usum afferre
potest.

XI.

Irritabilitas promovet secretionem.

XII.

In cavitate pectoris non reperitur aër elasticus.

XIII.

Pulmonis fabrica non est vesicularis, sed tæx cellulosæ similis.

XIV.

Natatio pulmonum in aqua, non certissime probat, infantem
spirasse.

XV.

Vinum est optimum cardiacum.

XVI.

Nervinorum remediorum virtutem agnoscimus, actionem ex-
plicare non possumus.

XVII.

Catharrus narium in nostris regionibus non valde timen-
dus est.

XVIII.

Interdum in febre biliosa præsentibus quoque & turgescenti-
bus sordibus, Venæ Sectio instituenda.

THESES.

I.

peruvianus ruber ad adstringentia potius remedia referentia
ad roborantia.

II.

peruvianus ruber majori circumspetione propinatio
n vulgaris.

III.

in frigidum corticis peruviani vulgaris debile & fere in-
vero corticis rubri efficax est remedium.

IV.

peruvianus ruber non esse videtur cortex trunci arbo-
ra officinalis L., sed ex alia specie, forsitan ex alio genere
in colligitur.

V.

peruvianus ruber magis puredini resistit, quam vul-

VI.

peruvianus ruber febriles motus sistit, quos vulgaris
non valet.

VII.

peruvianus ruber novum est remedium, nec antea

VIII.

cat Medicus, ne corticem peruvianum exhibeat, si obstru-
cerum iam præsentes sunt, aut si illæ timendæ.

IX.

